arXiv:2302.04260v1 [stat.ME] 8 Feb 2023

检验之检验：差分隐私假设检验框架

Zeki Kazan[1],Kaiyan Shi[2],Adam Groce[3],和 Andrew Bray[4]

[1]统计科学系，杜克大学[2]计算机科学系，马里兰大学[3]计算机科学系，里德学院[4]统计学系，加州大学伯克利分校

摘要

我们提出了一个以黑盒方式创建 *any* 假设检验的差分隐私版本的通用框架。我们从理论和实验两方面分析了由此产生的检验。最为重要的是，我们展示了该方法在小型数据集上的良好实际性能：在 $\epsilon = 1$，我们只需要完全公开设置下 5—6 倍的数据量。我们将本研究与现有的唯一一个同类型框架，以及若干针对单个问题设计的隐私假设检验进行了比较。与其他通用解决方案相比，我们的框架具有更高的检验功效，并且至少能够与（而且通常优于）针对单个问题设计的检验相竞争。

1 引言

假设检验是分析人员对数据进行的最基本、最常见的统计分析之一。假设检验的目的是判断数据中的某种“效应”（例如，男性比女性高）是否可能是样本中随机变异的结果，而非关于总体的真实事实。假设检验是社会科学、医学及其他领域统计分析的基石；根据数据类型和所关注的效应，研究者会采用各种不同的假设检验。

然而，这些领域的数据往往包含有关个人的私人信息。研究者在道德和法律层面都有义务保护这些数据的隐私，而且通常只有在能够保证分析不会侵犯相关个人隐私时，才能访问这些数据。在这种情况下，差分隐私已成为最具说服力的隐私保护形式化定义。

人们已经开发出许多常见假设检验的差分隐私版本，包括以下检验的隐私版本：χ^2 检验 [Fienberg 等人，2011年，Gaboardi 等人，2016年，Johnson 和 Shmatikov，2013年，Rogers 和 Kifer，2017年，Uhlerop 等人，2013年，Vu 和 Slavkovic，2009年，Wang 等人， 2015], 方差分析检验 [Campbell 等人，2018年，Swanberg 等人， 2019], 以及许多其他检验 [Alabi 和 Vadhan，2022年，Barrientos 等人，2019，Canonne 等人，2020，Couch 等人，2019，Ding 等人，2018，D’Orazio 等人，2015年，Narayanan，2022，Nguyˆen 和 Hui，2017年，Solea，2014，Sheffet， 2017]。然而，隐私研究人员必须针对每一种可能的假设检验仔细重复这项工作。对于最常用的检验，例如 χ^2 和方差分析，这样做尚可行；但对于种类繁多的现有假设检验——其中许多都高度针对特定情境——不可能指望这项工作一一重复。例如，经济学家（如 Gatignon 和 Xuereb [1997], Jaworski 和 Kohli [1993]）使用邹检验来检验回归线是否发生结构突变；研究有序数据的研究者（如 Kramer [1996], Uddin 和 Huynh [2018]）则使用有序逻辑回归。目前，要以保护隐私的方式进行这类分析，必须与隐私专家合作，并在研究隐私统计上耗费大量时间和精力，之后才能着手考虑实际问题。

本文提出了一个通用框架，可自动将任何现有假设检验转化为隐私版本，并展示了其实用性。例如，在 $\epsilon = 1$ 我们的方法通常只需比非隐私设置多 5 到 6 倍的数据，就能检测到给定效应。因此，我们的现成工具可与一些专门设计的隐私假设检验相媲美（有时甚至更胜一筹）。

1.1 我们的贡献

我们提出的框架可视为对文献中提及的一种方法的具体实现，尤其是 Canonne 等人 [2019, 2020]提出的方法。在 Canonne 等人 [2020], Cannone 等人将该方法描述如下。

> “存在一种黑盒方法，能够使用抽样聚合框架 A Nissim 等人， 2007]，从任意非隐私检验中获得差分隐私检验。具体而言，给定任意一个样本复杂度为 n 的检验器 A ，我们可以获得一个 ε-差分隐私检验器，其样本复杂度为 $O(n/\varepsilon)$ 。”

遗憾的是，这种方法仅在这两句话中有所提及。作者仅将其作为比较基准，以说明他们的方法具有更好的渐近性能。我们关注的并非渐近情形，而是具体的性能表现，因为这才能让私有统计在真实数据上得到实际应用。

上文引用的作者也没有完整说明他们所指的方法。经验丰富的隐私研究人员可以自行补全细节，但补全方式可能各不相同。我们的目标是完整补充这些细节，提供伪代码和公开可用的实现，同时以尽可能好的方式补全细节，并对所得检验的检验功效进行具体分析。具体而言，我们进行了以下工作：

- 我们提出了一个框架，可将任何已知的（非隐私）假设检验转化为隐私版本。该框架采用子采样与聚合方法，并使用 Awan 和 Slavković [2018]提出的一致最强二项检验进行聚合。

- 我们给出了精确的解析表达式，用底层非隐私检验的检验功效来表示我们检验的检验功效。这些有限样本（而非渐近）计算意味着，给定特定的公开检验后，可以轻松调整框架中的参数以优化其检验功效。通过这些计算，我们得出了这样的结论：只需公开检验所需数据量的 5–6 倍，就能实现 $\epsilon = 1$ 隐私；但我们强调，这是一个上界，并未 针对特定检验调整参数，而在实践中，我们的统计功效往往显著更高。

- 我们实现了该框架，并用它对若干特定检验进行隐私化处理[1]。特别是，我们考察了 Cannone 等人认为该方法不如其方案有检验功效的情形。我们发现，尽管他们的方法渐近性能更优，但在一系列实际场景中，我们的框架表现胜过他们的检验。例如，在效应量较大时，我们在 $n = 65$即可达到 80% 的检验功效，而他们的检验在 $n < 359$ 时无效，且直到 $n = 6500$才达到 80% 的检验功效。

在同期开展的研究中，Pe˜na 和 Barrientos [Pe˜na 和 Barrientos， 2022] 也提出了一个通用框架，实现了上文引用的 Canonne 等人所提出的思路。我们推迟了本研究的发表，以便加入与他们框架的完整比较，相关内容见第4节。与他们的框架相比，我们的框架具有显著更高的检验功效，而且（与他们的框架不同）适用于所有数据库规模、 ϵ 取值以及公开检验的选择。

下面我们概述差分隐私假设检验。第3节将介绍我们的检验程序，并给出伪代码以及检验功效的解析表达式。第4节将我们的框架与唯一现有的替代方案——Pe˜na 和 Barrientos 的方案——进行比较。最后，第 5 节将我们的通用框架与一些现有的特定隐私检验进行比较。

2 背景

本节首先讨论一般意义上的假设检验。随后介绍差分隐私以及我们将用到的结果。最后，概述差分隐私假设检验的先前工作。

[1] 实现我们方法的代码可在 `https://github.com/diff-priv-ht/test-of-test` 获取 s.

2.1 假设检验

设想一位研究者想确定一种新型神奇减肥药是否像宣传的那样有效。他们测量两组参与者的减重情况，其中一组服用该药，另一组服用安慰剂。他们想知道这种药是否产生了显著效应。第一步是提出一个零假设（H_0）——一种关于数据分布的理论。这里 H_0 可能是，两组之间的差异源于随机变异；该药并不比安慰剂更有效。

为检验数据 $\mathbf{x}$ 是否与 H_0 一致，研究者将计算一个检验统计量$\tau(\mathbf{x})$。用于计算检验统计量的函数 τ 的选择，在很大程度上决定了所采用的假设检验。对于根据 H_0 抽取的随机数据库 $\mathbf{X}$，统计量 $T = \tau(\mathbf{X})$ 的分布可以通过解析方法或模拟确定。随后，研究者会计算一个p 值，即在 H_0 下，观测到的检验统计量或更极端的值出现的概率。

定义 2.1. 对于观测到的检验统计量 $t = \tau(\mathbf{x})$ 和零假设 H_0，单侧p 值 p定义为

$$p = \Pr[T \geq t \mid T = \tau(\mathbf{X}) \text{ and } \mathbf{X} \leftarrow H_0].$$

如果函数 τ 选择得当，那么 $\mathbf{X}$ 的底层分布与 H_0 下的分布差异越大，出现较低 p 值的可能性就越高。通常会选定一个显著性阈值 α，当 $p < \alpha$ 时，便拒绝将 H_0 视为数据的合理解释。α 的选择决定了第一类错误率，即错误拒绝真实零假设的概率。

我们将临界值 t^* 定义为当 $p = \alpha$ 时检验统计量 t 的取值。我们用它来定义统计功效，即衡量假设检验发现效应（也就是说，拒绝错误零假设）的可能性。检验功效取决于 $\mathbf{X}$ 的底层分布与 H_0 下的分布之间的差异，以及数据库的大小。

定义 2.2。对 于给定的备择数据分布 H_A，假设检验的统计功效 θ，是一个假设检验 i s

$$\theta = \Pr[T \geq t^* \mid T = \tau(\mathbf{X}) \text{ and } \mathbf{X} \leftarrow H_A].$$

假设检验设计的目标是最大化统计功效，理想情况下，找到一个对多种效应都表现良好的单一检验。

2.2 差分隐私

为了使公众相信可以将其机密数据用于统计分析，研究者需要保证敏感信息不会遭到泄露。事实证明，以往用于保护个人隐私的方法（例如匿名化）在许多情况下都失效了（例如，Sweeney [2002],Narayanan 和 Shmatikov [2008],Homer 等人 [2008]）。

差分隐私由 Dwork 等人于 2006年 提出。 [Dwork 等人， 2006], 是隐私的一种形式化定义。它要求无论某个个体的信息取值如何，任何输出出现的概率都大致相同，从而保护该个体的隐私。仅在一个个体的数据上有所不同的数据库称为相邻 数据库。

~**定义 2.3** （差分隐私）。若数据库上的随机化算法 f 满足以下条件，则称其为（ε, δ）差分隐私：对于所有 $\mathcal{S} \subseteq \text{Range}(f)$ 以及仅在一行的取值上有所不同的数据库 $\mathbf{x}$、 $\mathbf{x}'$：

$$\Pr[\tilde{f}(\mathbf{x}) \in \mathcal{S}] \leq e^{\varepsilon} \Pr[\tilde{f}(\mathbf{x}') \in \mathcal{S}] + \delta.$$

~有可能出现 $\delta = 0$。在此条件下，随机化算法 f 称为 ε-差分隐私。一般而言， ε 表示隐私级别（ ε 越小，隐私保障越高），而δ 决定隐私失效的可能性。（ε, δ）-差分隐私保障了隐私损失以 e^{ε} 为界的概率为 $1 - \delta$。

差分隐私具有抗后处理性——如果某个算法是差分隐私的，那么对其输出进行的任何进一步分析或计算（不依赖于数据库）也会产生隐私输出。

定理 2.4（后处理）。 设 f 是一个（ε, δ）-差分隐私随机算法。设 g 是一个任意的随机化算法。那么 $g \circ f$ 是（ε, δ）- 差分隐私的。

任何差分隐私算法都必须是随机化的。最流行（也最简单）的方法是拉普拉斯机制，由 Dwork 等人提出。 [Dwork 等人， 2006], 该机制向待隐私化的查询输出添加从拉普拉斯分布中抽取的噪声。

定义 2.5（拉普拉斯分布）。 以 0 为中心、尺度为 b 的拉普拉斯分布，其概率密度函数为

$$\mathsf{Lap}(x|b) = \frac{1}{2b}\exp\Big(-\frac{|x|}{b}\Big).$$

我们用 Lap(b) 表示尺度为 b 的拉普拉斯分布。

数据库中的单行数据发生变化时，查询输出可能发生的变化幅度称为全局敏感度。

定义 2.6（全局敏感度）。 函数 f 的全局敏感度为:

$$GS_f = \max_{\mathbf{x},\mathbf{x}'} |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}')|,$$

其中，$\mathbf{x}$ 和$\mathbf{x}'$ 是相邻数据库。

标准差 所使用的拉普拉斯分布的离差取决于 ε 和 GS_f .

定义 2.7（拉普拉斯机制）。 给定任意函数 f，拉普拉斯机制定义为 s

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + Y,$$

其中， Y服从 Lap(GS_f/ε)，而 GS_f是 f的全局敏感度。

定理 2.8（拉普拉斯机制）。 拉普拉斯机制 （ε,0)-差分隐私。

尽管拉普拉斯机制能够确保输出不会侵犯隐私，但有时全局敏感度过大，导致拉普拉斯噪声淹没信号。子抽样与聚合 技术[Nissim 等人， 2007] 旨在缓解这一问题。子抽样与聚合的做法正如其名称所示。首先，将包含 n 行的数据库$\mathbf{x}$ 划分为 m 个大小大致相等的组。然后，在每个组中独立计算非隐私函数 f 。最后，通过某种差分隐私机制聚合这些中间结果。

2.3 相关工作

大量（且迅速增长的）文献研究了如何将公开假设检验转换为隐私场景中的检验。其中一类研究 [Smith，2008年、2011年，Wasserman 和 Zhou， 2010] 探讨了差分隐私检验统计量的分布收敛到公开检验统计量分布的速度。然而，这些结果往往是渐近性的，对于如何实现检验几乎没有提供实用方法。Wang 等人 [2018] 对生成参考分布的问题进行了更全面的研究，并提供了一种通用方法，用于近似差分隐私检验统计量的抽样分布。

另一类研究探讨了对 χ^2 独立性检验的检验统计量进行隐私化的问题。这包括针对全基因组关联研究（GWAS）数据的研究 [Fienberg 等人，2011年，Johnson 和 Shmatikov，2013年，Uhlerop 等人， 2013], 尽管这些研究往往依赖渐近论证来保证 p 值的均匀性。其他研究 [Gaboardi 等人，2016年，Wang 等人， 2015] 表明，蒙特卡罗方法能够生成更好的参考分布。Vu 和 Slavkovic [2009] 提出了通过校正拉普拉斯噪声来生成 p 值的具体方法，而 Rogers 和 Kifer [2017] 提出了其他检验统计量，这些统计量具有性质更理想的参考分布。

近期关于差分隐私假设检验的研究开始纳入深入的功效分析。Awan 和 Slavkovi´c [2018] 构造了适用于二项数据的一致最强检验（更多讨论见第 3.1 节）。Brenner 和 Nissim [2010] 表明，对于




图1：算法1的图示。

定义域包含两个以上元素的数据，不存在一致最强检验。Nguyˆen 和 Hui 提出了差分隐私生存分析方法 [Nguyˆen 和 Hui， 2017], 另有两项研究探讨了正态分布均值差异的问题 [Ding等人，2018年，D'Orazio 等人， 2015], 还有多项研究考虑了线性回归系数的假设检验问题 [Alabi 和 Vadhan，2022，Barrientos 等人，2019，Sheffet， 2017]。其中，Barrientos等人 [2019] 的研究值得注意，因为它与我们在此提出的框架在概念上有一些相通之处。少数研究针对单变量 [Solea， 2014] 和多变量 [Canonne 等人，2020，Narayanan， 2022] 情形下的正态分布均值提出了检验。两项研究考察了单因素方差分析 [Campbell 等人，2018年，Swanberg 等人， 2019], 不过，非参数替代方法的表现优于这些研究 [Couch 等人， 2019]。Avella-Medina [2021] 提出了一种基于M-估计量的假设检验，适用于一般参数模型，包括上述许多模型。

3 框架

这里我们介绍检验的检验（ToT）框架并分析其检验功效。我们还讨论如何针对特定情形优化框架的参数。

3.1 PrivateBinomial检验

Awan 和 Slavkovi´c [Awan 和 Slavkovi´c， 2018] 针对二项数据开发了一种一致最强检验。他们定义了截断均匀拉普拉斯（Tulap）分布，即离散拉普拉斯分布与均匀分布之和。该分布由位置参数 m 和尺度参数 $b \in (0, 1)$ 确定。其累积分布函数具有闭式表达；参见 Awan 和 Slavkovi´c [2018] 中的定义4.1。 [2]

设 $A \sim$ 二项分布(n, p)。Awan 和 Slavkovi´c 表明，隐私检验统计量 $Z|A \sim$ Tulap$(A, e^{-\varepsilon})$ 是 ε-差分隐私的 A 估计。他们还提供了一种算法，用于生成 p 值以检验假设

$$H_0 : p \leq p_0 \quad \text{and} \quad H_A : p > p_0$$

并证明所产生的 p 值是该检验的最小 ε-DP p 值。更多细节请参见 Awan 和 Slavkovi´c [2018] 的定理7.2和算法2。

算法1 检验的检验

输入： $\mathbf{x}$，τ，ε，α，m，α_0

将$\mathbf{x}$ 划分为子集$\mathbf{x}_1$，.. .，$\mathbf{x}_m$

对于 $j = 1$ 到 m，**执行**

  如果 τ 可以在$\mathbf{x}_j$ **上运行，则**

    $p_j \longleftarrow \tau(\mathbf{x}_j)$

  else

    $p_j \sim$ Unif(0,1)

  结束 if

结束 for

$a \longleftarrow |\{p_j : \ p_j < \alpha_0\}|$

$z \longleftarrow$ Tulap(a，$e^{-\varepsilon}$)

$p.value \longleftarrow P(B + N \geq z)$

输出： z，$p.value$

3.2 我们的算法

现在我们介绍一般算法，并将其称为检验的检验 (ToT)，该算法能够对所有假设检验进行隐私保护。算法1给出了形式化描述，图1展示了其图示。给定一个大小为 n 的数据库$\mathbf{x}$，我们的目标是在该数据库上运行假设检验 τ [3] 的 ε-私有版本，显著性阈值为 α_0。我们首先将输入数据库划分为 m 个大小相等的子集$\mathbf{x}_1, \ldots,$ $\mathbf{x}_m$。在实践中，如果 $m \nmid n$，则应视情况将子集的大小设为 $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 和 $\lceil \frac{n}{m} \rceil$。为简化起见，以下结果均假设 $m \mid n$。在每个子集中，我们执行公开检验 τ，计算 p 值，并依据子检验显著性阈值 α_0 决定接受或拒绝。如果子样本中的数据点数量不足以执行公开检验，则从 Unif(0,1) 中抽取 p 值。设 a 为拒绝的次数。在零假设分布下，每次检验以 α_0 的概率拒绝，因此 a 服从二项分布。

接下来，我们对 a 进行 Awan 和 Slavkovi´c 的私有二项检验，以判断它是否符合参数为 α_0 的二项分布。为了使 a 实现差分隐私，我们定义 $z =$ Tulap(a，$e^{-\varepsilon}$)。令 $B \sim$ Binomial(m，α_0)，且令 $N \sim$ Tulap(0，$e^{-\varepsilon}$)。那么，参考分布为 $B + N$，因此 p 值为 $P(B + N \geq z)$。

请注意，在列出的输入中，$\mathbf{x}$、τ、ϵ 和 α 是用户提供的真实输入，而 m 和 α_0 是可以优化的参数。我们将在第 3.4 节讨论这种优化。

算法1 的隐私性和有效性可直接由其设计得出。

定理3.1。 *算法1 满足 ε-差分隐私。*

证明。 根据子抽样与聚合 [Nissim 等人， 2007] 以及 Awan 和 Slavkovi´c [Awan 和 Slavkovi´c 的定理 6.1，该定理表明，发布带有 Tulap噪声的统计量满足隐私要求，因此发布 z 是ε-差分隐私的。根据定理 2.4（后处理），发布 p 值也满足 ε-差分隐私。 □

定理3.2。 *算法1有效。也就是说，当数据来自 H_0 时，拒绝概率至多为 α。*

证明。 每个 m 子组以至多 α 的概率拒绝（即被计入计数 a）。对于大多数子组，这可由公开检验 τ的有效性得出。当无法运行 τ 时，则可由均匀抽取 p_j得出。由此，根据 Awan 和 Slavkovi´c[2018] 的结果，有效性立即成立。 □

3.3 理论功效

现在，我们可以分析检验的检验框架的统计功效。首先，我们指出其关于 ε 的渐近样本复杂度。Canonne 等人 [2020], 对此给出了结论，但未提供证明；我们将在

[2]Tulap分布还有第三个参数 q，但我们始终将 $q = 0$ 设为，因为我们的目标是实现 $\delta = 0$。通过改变 q，可以实现 $\delta > 0$，并会提高检验的检验功效。[3]为简洁起见，我们使用 τ 表示采用 τ（$\mathbf{x}$）的检验。

θ	α_0	ρ	α	ε	$\tilde{m}$
0.80	0.05	0.80	0.05	1	5
0.80	0.05	0.80	0.05	0.1	44
0.95	0.05	0.95	0.05	1	6
0.95	0.05	0.95	0.05	0.1	52

表1：对于显著性水平为 α_0、检验功效为 θ 的公开检验 τ，若要使我们的 ε-隐私检验在显著性水平为 α 时达到 ρ 的检验功效，最多需要增加 $\tilde{m}$ 倍的数据。

附录 A 中给出证明。

定理3.3。 我们的检验达到 ρ 检验功效所需的样本数为 $n = \mathcal{O}(c/\varepsilon)$，其中 c 是非隐私检验所需的样本数， τ。

本工作的重点不是渐近性能，而是在小规模 n 上的实际性能；为此，我们需要精确计算任意 ToT 实例的检验功效。

定理 3.4。 设 θ 为公开检验 τ 在每个 m 个子样本中的检验功效，显著性水平为 α_0。设 $A \sim$ 二项分布(m, θ)， $Z|A \sim \mathrm{Tulap}(A, e^{-\varepsilon})$， $B \sim$ 二项分布(m, α_0)，以及 $N \sim \mathrm{Tulap}(0, e^{-\varepsilon})$。那么，我们的检验功效为

$$\mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta) = (1 - F_Z(F^{-1}_{B+N}(1-\alpha))).$$

该定理的证明较为繁琐，因此为清晰起见，我们将其放在附录 A 中。请注意， F^{-1}_{B+N} 没有已知的解析形式，因此在通过定理 3.4 计算检验功效时，必须通过数值方法确定该分布的分位数。

如果关注的是某个具有已知特征的特定公开假设检验，则可以利用上述结果确定所需样本量的上界，使隐私化检验达到 ρ 检验功效。（证明见附录 A。）

推论 3.5。 假设某个公开假设检验 τ 在任意数据选择下，以显著性水平 α_0 达到 θ 检验功效所需的数据点不超过 n 个。那么，为使隐私参数为 ε的隐私检验以显著性水平 α达到 ρ 检验功效，所需数据点数的上界为 $n\tilde{m}$，其中 $\tilde{m}$ 是满足 $\rho \le \mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta)$ 的最小 m 。

由于检验功效 $\mathcal{P}$ 随 m 严格递增，因此可以直接通过数值方法确定 $\tilde{m}$ 。这使我们能够对隐私检验相较于相应公开检验需要多多少数据作出一般性说明。表1展示了一些示例。例如，第一行表明，任何 在 $\alpha = 0.05$ 时达到 80% 检验功效的公开检验，都可以在 $\varepsilon = 1$ 下进行隐私化（方法是直接将该公开检验用作子检验），从而获得相同的检验功效和显著性，但需要 $\tilde{m} = 5$，也就是说，隐私检验所需的数据量是公开检验的 5 倍。若要达到95%的统计功效，则需要公开检验 6 倍的数据。（对于 $\varepsilon = 0.01$ ，这些倍数分别为 44 倍和 52 倍。）

我们强调，尽管这些一般性结论非常强，但它们只是上界。这是因为，如果不指定检验，就无法判断当子检验的 α_0 与总体检验试图达到的 α 不同时会发生什么。对于任何特定检验，都可以改变 α_0 ，以找到更好的设置。例如，对效应量为 0.65 个标准差的数据进行 $\alpha = 0.05$ 的 z 检验时，在 $n = 20$ 下可达到 80% 检验功效，这意味着上述结论保证在 $\varepsilon = 1$ 隐私场景下获得相同检验功效所需的数据不会超过 $n = 100$ 。但是，如果允许 α_0 取 0.05 以外的值，我们会发现实际上只需 $n = 70$ 即可达到这一目标，也就是说，隐私成本为 $3.5\times$ ，而非 $5\times$。在 $\varepsilon = 0.01$ 时，需要 $n = 420$，隐私成本为 $21\times$ ，而不是表中上界给出的 44。

举另一个例子：对具有相等组内方差和组间方差的数据进行三个组的方差分析检验。表中达到95%的统计功效所需的上界是：在 $\varepsilon = 1$ 时需要 $6\times$ 数据，在 $\varepsilon = 0.01$时需要 $52\times$数据；而优化检验只需要 $3.6\times$ 和 $41\times$ 数据。

3.4 优化

变量 m （子样本数量）和 α_0 （子检验显著性阈值）必须进行优化。幸运的是，我们发现，没有必要对这些参数进行极其详尽的优化。针对某一效应量的最优 m， α_0 组合通常能在很大范围的效应量上发挥足够好的效果，检验功效通常只会降低1%至2%。

当近似的预期效应量已知时，我们可以轻松计算 θ，即公开检验 τ 的检验功效，适用于任意样本量。对于固定的 m，可以使用标准技术找到使 $\mathcal{P}(\varepsilon,\ \alpha,\ m,\ \alpha_0,\ \theta)$ 最大化的 α_0 。然后，对于合理集合中的所有 m，重复此过程，以找到最佳的 m， α_0 配对。在我们的模拟中，我们使用集合 $\{1, 2, 3, \ldots, \lfloor\sqrt{n}\rfloor, \ldots \lfloor\frac{n}{3}\rfloor, \lfloor\frac{n}{2}\rfloor, n\}$，发现对于 $n = 100$ 处的 t 检验，该过程耗时不到 20 秒。

然而在实践中，近似的预期效应量通常无法事先得知。在这种情况下，我们建议固定一个期望的检验功效 ρ，并优化 m， α_0 配对，使其能够以 ρ 检验功效检测到的效应量最小。具体做法是，先建立一个效应量网格并执行二分搜索；在每一步中，针对已知效应量使用上述过程，从而找出网格中能够以 ρ 检验功效检测到的最小效应量。然后使用该组合中的 m， α_0 来运行检验之检验。在我们的模拟中，我们使用长度为 16 的网格，发现对于 $n = 100$ 处的 t 检验，该过程耗时不到一分半。

有趣的是，我们注意到，优化往往倾向于较大的 m 值：子样本非常小，而子检验的显著性阈值较高。事实证明，与少量更可靠的检验相比，聚合大量信息量极低的检验更为可取。

4 与 Pe˜na-Barrientos 框架的比较

Pe˜na 和 Barrientos [Pe˜na 和 Barrientos 2022], 与本研究同期提出了自己的框架（下文简称 PB），用于将任意公开假设检验隐私化。与我们的框架一样，他们的框架也遵循子采样与聚合的思路，这一思路最初由 Canonne 等人提出。 [Canonne 等人， 2019]。

两种方法都先在数据集的子样本上运行公开检验，但聚合方式有所不同。PB 提出了一种本质上是定制的二项检验，其依据是随机响应类方法。相比之下，我们使用 Awan 和 Slavkovi´c 的二项检验，该检验已被证明是最优的。因此，在这种一般设计类型中，我们的框架具有尽可能高的检验功效。

定理 4.1。 对于任意选择的公开检验 τ 和隐私参数 ϵ，由 *ToT* 框架得到的隐私检验的统计功效将高于由 *PB* 框架得到的检验。

证明。 固定子检验数量 m 和子检验显著性阈值 α_0。那么，检验的检验具有更高检验功效，是 Awan 和 Slavkovi´c [Awan and Slavkovi´c, 2018] 的主要结果直接推导出的结论。在算法1 的 for 循环结束之前，两个框架完全相同；算法剩余部分可视为二项检验，用于判断子检验中“拒绝”决策的比例是否大于 α_0。由于 Awan 和 Slavkovi´c 的二项检验已被证明是在这种情况下的一致最强检验，因此其检验功效必然高于 PB 框架执行的操作。

允许检验的检验使用其自身的最优 m 和 α_0 （而不是与 PB 的设置相匹配），只会进一步扩大两个框架之间的差距，因为最优值可能不同。 □

PB 框架除了简单地降低检验功效外，还有其他缺点。检验的具体细节意味着，它并非在所有参数设置下都能获得有效结果。具体而言，该检验只有在达到最低 m 值时才能运行。由于公开检验本身通常需要一定量的数据，这意味着有时必须先收集相当数量的数据，才能使用 PB 检验。（例如，在$\varepsilon = 1$ 和 $\alpha = 0.05$ 的情况下，PB 要求 $m \geq 7$；当 $\varepsilon = 0.1$时，这一要求会增加到 $m \geq 67$ 。）

此外，在给定其他参数的取值后， α_0 必须 设为一个特定值，才能确保较大检验所得的α 准确。这会减少优化中的一个自由度，进一步降低检验功效。PB 提出了两种参数设定方法。第一种实际上完全不涉及优化，而是建议将 m 设得尽可能低。这适用于“低检验功效”场景，其目标是在尽可能低的 n下获得显著的检验功效。（相比之下，我们发现， m 非常高时，往往能获得更好的检验功效。）我们在比较计算中采用了这种方法，不过也指出，他们还建议，可以针对各种参数取值计算功效曲线，再通过目视检查选出最佳参数。这




图 2：不同样本量下 Pe˜na 和 Barrientos [2022] 以及检验之检验的检验功效比较n，其中 $\alpha = 0.05$，并使用 $\sigma = 1$的 t 检验。上图的效应量为 $\mu = 0.4$ 且 $\varepsilon = 1$；下图为 $\mu = 3$ 且 $\varepsilon = 0.1$。按照第 3.4 节中的讨论，我们针对检验之检验优化 m，α_0，目标为 $\rho = 0.9$。

要达到高检验功效，必须采用这种方法，因为将 m 设为尽可能低的值，会得到 PB 检验检验功效的一个上界；这意味着随着 n 增大，检验功效不会趋近于 100%。（在现实场景中，该上界可能低至 80%。）

在附录 A 中，我们给出了定理 3.4 针对 PB 检验的对应结果，因此可以直接比较检验功效，而不必依赖近似模拟。图 2 展示了两个示例中 PB 和我们的 ToT 框架的精确检验功效。我们将 t 检验用作公开检验。在上图中，效应量适中且 $\varepsilon = 1$时，PB 框架需要多 40% 的数据才能达到 80% 的检验功效（ToT 需要 $n = 200$，PB 需要 $n = 280$）。在下图中，效应量较大且 $\varepsilon = 0.1$时，两者差距更大。此时 ToT 只需要 $n = 125$ 即可达到 80% 的检验功效，而 PB 要到 $n \geq 134$ 才能运行，且要到 $n = 348$ 才达到 80% 的检验功效（增加 178%）。附录 B 中还提供了隐私化 z 检验和方差分析的其他比较。

5 与量身定制的检验进行比较

本节将展示如何将 ToT 框架应用于若干假设检验，包括多元正态数据的均值检验和单因素方差分析。这些检验此前都已有相关研究，因此我们可以将这种通用技术与专家针对特定情形精心设计的检验进行比较。

5.1 多元正态数据的均值

由于我们所用的一般方法最早由 Canonne 等人提及（但随后被否定），[2019, 2020],我们首先运用框架，为相同情形构建一个检验。在此情形中，分析人员观察到从多元正态分布中抽取的数据，$\mathbf{x} = \{\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n\}$ 和 $\mathbf{X}_i \sim \mathcal{N}_d(\boldsymbol{\mu}, \mathbb{I}_d)$。零假设为 $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$，而备择假设为 $\boldsymbol{\mu} \neq \mathbf{0}$。针对这一设定的公开假设检验使用检验统计量 $Z = n \sum_{j=1}^{d} \bar{X}_j^2$，已知其服从分布 $\chi^2(df = d)$。我们将在算法 1 的 p 值计算步骤中使用此检验。我们还会计算该检验的检验功效。（下文定理的证明见附录 A。）




图 3：Canonne 等人 [2020] 与检验的检验在不同样本量 n下的检验功效比较。对于上图，所有 i均为 $\mu_i = 0.1$；对于下图，$i \neq 1$为 $\mu_1 = 0.5$ 和 $\mu_i = 0$。我们为检验的检验设定 $d = 100$、$\varepsilon = 1$ 和 α，并将公开检验设定为与 Canonne 等人 [2020]检验的第一类错误相匹配。按照第 3.4 节中的讨论，我们针对检验的检验优化 m，α_0，目标为：$n \leq 500$ 时取 $\rho = 0.9$，$n > 500$时取$\rho = 0.99$。

定理 5.1。设 F_0和 F_A分别为 $\chi^2(df = d)$与 $\chi^2\left(df = d, \lambda = n\sum_{j=1}^{d}\mu_j^2\right)$的累积分布函数，其中 n 为样本量，μ_j 为 $\boldsymbol{\mu}$的第 j^{th} 个条目。那么，显著性水平为 α 的公开检验的检验功效为 $1 - F_A(F_0^{-1}(1-\alpha))$。

执行检验并不需要这个检验功效的解析表达式，但有了它便能更高效地进行优化，也意味着我们的图展示的是检验的精确检验功效，而非蒙特卡洛近似。

Canonne 等人 [2020] 针对这一场景提出了一种计算高效的隐私检验[4]，并证明其对 ε 和效应量的渐近依赖性优于我们在此采用的策略。Narayanan [2022]提出了另一种渐近性能更优的检验。遗憾的是，该算法仅以一般的渐近形式描述，缺少实现所需的具体细节。因此，我们将其与 Canonne 等人提出的检验进行比较。

Canonne 检验没有可调节的 α 值。相反，分析人员需要输入一个参数γ，[5] 它是零假设分布 $\mathcal{N}_d$（$\mathbf{0}$，$\mathbb{I}_d$）与备择分布 $\mathcal{N}_d$（$\boldsymbol{\mu}$，$\mathbb{I}_d$）之间全变差距离的下界。随后，该检验能够以 2/3 的概率区分这两个分布，所需样本复杂度为 $\tilde{\mathcal{O}}\left(d^{1/2}/\gamma^2 + d^{1/2}/(\gamma\varepsilon)\right)$. 这意味着，当 n足够高时，第一类错误将趋近于 1/3；但在 n较低时，第一类错误可能高得多。事实上，存在一个阈值 $\max\left\{25\log\frac{d}{\delta}, \frac{5}{\varepsilon}\log\frac{1}{\delta}\right\}$，低于该阈值时检验总是拒绝（第一类错误率为 100%）。略高于此阈值时，第一类错误率约为 50%，并且在我们考虑的整个 n 取值范围内都维持在这一水平。（附录 A 对这一第一类错误率进行了解析证明，附录 B 则通过实验予以确认。）因此，为了公平比较，我们将检验中的 α 值设为 0.5，但需要指出的是，我们的检验具有优势：α 可以任意设置。

在比较中，我们设定 $d = 100$ 和 $\varepsilon = 1$。ToT 使用纯差分隐私，其中 $\delta = 0$，但 Canonne 检验要求 δ 非零。我们设定 $\delta = 10^{-3}$，我们认为这对其非常有利，远高于通常认为在实践中可接受的水平。我们设定 $\gamma = 0.1$。在 Canonne 检验不再一概拒绝所有输入之前，我们不展示其功效曲线；对于这些参数，这一情况发生在 $n = 359$。

[4]Narayanan [2022]指出了这项工作中的一个错误，但该错误出现在第二种算法中，与本次比较无关。[5]我们将这个参数称为 γ，而不是论文中的 α，以避免符号冲突。




图 4：Couch 等人 [2019], Swanberg 等人 [2019], 的方法与检验之检验在不同样本量下的检验功效比较 n。效应量为 $\eta = 1, \varepsilon = 1$，组数为 $g = 3$。所有组的大小相等，且 $\alpha = 0.05$。所有非公开功效曲线均通过模拟估计。按照第 3.4 节所述，我们针对检验之检验优化 m， α_0 ，目标为 $\rho = 0.9$。

我们考虑两种可能的效应：一种是所有坐标上的真实均值均相差 0.1 个标准差，另一种是仅单个坐标上的真实均值相差 0.5 个标准差。结果见图 3。

在第一种情况下，效应量较大，我们在 $n = 65$ 时达到 80% 的检验功效，而 Canonne 检验直到 $n = 359$ 才有效，并且直到 $n = 6500$ 才达到 80% 的检验功效。在第二种情况下，效应量较小，差距有所缩小，但仍然相当显著。ToT 只需 20% 的数据量即可达到 80% 的检验功效——190 个数据点，而 Canonne 需要 850 个。（在 99% 的检验功效下，差距较小，ToT 所需数据量为 Canonne 所需数据量的 87%。）更多比较见附录 B。

当然，Canonne 检验的渐近性能确实更好，因此对于某个足够小的ε 和效应量（以及足够大的 δ），它会成为检验功效更高的检验。然而，在许多实际情况下，这种渐近优势尚未显现，此时 ToT 是更好的选择。

5.2 单因素方差分析

作为第二个例子，我们考虑单因素方差分析，它用于检验各组数据的均值是否相同。形式上，每个 g组的均值为 μ_g。每组中的数据均来自 $\mathcal{N}(\mu_i,\ \sigma^2)$，其中 σ 为固定但未知的量。在 H_0 下，所有组的均值相等；而在 H_A 下，某些均值不同。此情形下的经典检验使用 F 统计量，该统计量在 H_0 下服从已知分布。（更全面的介绍请参见 Rice [2007]。）在此分析中，我们关注组大小相等的情况。我们将组间方差与组内方差之比 $\eta = \text{Var}(\mu_1, \ldots\ldots, \mu_g)/\sigma^2$ 称为效应量。在此情形下，方差分析的检验功效有已知解，且大多数统计软件均可计算。

这一设定是许多重要研究的主题。Campbell 等人 [2018] 提出了首个隐私检验，随后 Swanberg 等人 [2019] 对其进行了改进，之后 Couch 等人 [2019]又进一步改进。据我们所知，Couch 等人的隐私非参数检验是这一设定下目前最强大的隐私检验，因此将用作评估检验之检验性能的基准。

为了与 Couch 等人的检验进行比较，我们选择了 Couch 等人图 3 中的设定 [2019]，该设定考察隐私级别 $\epsilon = 1$ 和效应量 $\eta = 1$。如图 4 上图所示，检验之检验的表现稍差，但差异很小。（Couch 等人所需的数据量比其少 22%，即可达到 80% 的检验功效。）它的表现远胜于 Swanberg 等人的检验。重要的是，与针对这一设定量身定制的检验不同，检验之检验无需通过模拟来估计参考分布。因此，检验之检验运行起来更快（而且 p 值可以说也更准确）。

改变设定后可以看出，这两种检验无法相互比较。我们在附录 B 中提供了更多示例。效应量较小时，ToT 与先前工作的差距会扩大；而效应量较大和/或 ε较小时，ToT 实际上会成为最先进水平中检验功效最高的检验，不过领先幅度不大。无论比较的具体情况如何，我们都很欣喜地发现，我们的通用框架竟能与一种针对特定情境精心开发、经过高度打磨的检验相媲美。

致谢

我们感谢 Andr´es Barrientos 分享实现其并行工作的代码，也感谢 Canyon Foot 编写了一些我们至今仍在使用的原始函数。所有作者均获得美国国家科学基金会 SaTC-1817245 号拨款的支持。Kaiyan Shi 还获得了美国陆军研究办公室 W911NF-20-1-0015 号拨款的额外支持，Zeki Kazan 则获得了美国国家科学基金会 SES-2217456 号拨款的支持。

参考文献

Daniel Alabi 和 Salil Vadhan。差分隐私线性回归的假设检验。载于 Alice H. Oh、Alekh Agarwal、Danielle Belgrave 和 Kyunghyun Cho（编），神经信息处理系统进展，2022年。

Marco Avella-Medina。隐私保护参数推断：稳健统计的一个案例。《美国统计学会会刊》，116(534):969–983，2021年。

Jordan Awan 和 Aleksandra Slavkovi´c。针对二项数据的差分隐私一致最强检验。载于神经信息处理系统进展，第4208–4218页，2018年。

Andr´es F Barrientos、Jerome P Reiter、Ashwin Machanavajjhala 和 Yan Chen。针对回归系数的差分隐私显著性检验。计算与图形统计学杂志，第1–24页，2019。

Hai Brenner 和 Kobbi Nissim。差分隐私全局最优机制的不可能性。在*2010*年 *IEEE* 第*51*届计算机科学基础年度研讨会，第71–80页。IEEE，2010年。

Zachary Campbell、Andrew Bray、Anna Ritz 和 Adam Groce。差分隐私方差分析检验。在*2018*年第*1*届数据智能与安全国际会议（*ICDIS*），第281–285页。IEEE，2018年。

Cl´ement L Canonne、Gautam Kamath、Audra McMillan、Adam Smith 和 Jonathan Ullman。简单假设的最优隐私检验结构。在第*51*届*ACM SIGACT*计算理论研讨会论文集，第310–321页，2019。

Cl´ement L Canonne、Gautam Kamath、Audra McMillan、Jonathan Ullman 和 Lydia Zakynthinou。高维分布的隐私身份检验。神经信息处理系统进展，33：10099–10111，2020。

Simon Couch、Zeki Kazan、Kaiyan Shi、Andrew Bray 和 Adam Groce。差分隐私非参数假设检验。载于*2019*年*ACM SIGSAC*计算机与通信安全会议论文集，第 737–751 页，2019。

Bolin Ding、Harsha Nori、Paul Li 和 Joshua Allen。局部差分隐私下的总体均值比较：显著性与检验功效。载于第三十二届*AAAI*人工智能会议，2018年。

Vito D'Orazio、James Honaker 和 Gary King。社会科学推断中的差分隐私。斯隆基金会经济学研究论文，2015年。

Cynthia Dwork、Frank McSherry、Kobbi Nissim 和 Adam Smith。为隐私数据分析中的敏感度校准噪声。载于密码学理论会议，第 265–284 页。施普林格，2006年。

Stephen E Fienberg、Aleksandra Slavkovic 和 Caroline Uhler。保护隐私的全基因组关联研究数据共享。载于数据挖掘研讨会（*ICDMW*），*2011*年*IEEE*第*11*届国际会议，第 628–635 页。IEEE，2011年。

Marco Gaboardi、Hyun-Woo Lim、Ryan M Rogers 和 Salil P Vadhan。差分隐私卡方假设检验：拟合优度与独立性检验。载于*ICML'16 Proceedings of the 33rdInternational Conference on International Conference on Machine Learning-Volume 48*。JMLR，2016年。

Hubert Gatignon 和 Jean-Marc Xuereb。企业的战略导向与新产品绩效。《营销研究杂志》，34(1):77–90，1997年。Nils Homer、Szabolcs Szelinger、Margot Redman、David Duggan、Waibhav Tembe、Jill Muehling、John V Pearson、Dietrich A Stephan、Stanley F Nelson 和 David W Craig。利用高密度SNP基因分型微阵列，解析高度复杂混合物中贡献微量DNA的个体。*PLoS*遗传学，4(8):e1000167，2008年。Bernard J Jaworski 和 Ajay K Kohli。市场导向：前因与后果。《营销学杂志》，57(3):53–70，1993年。Aaron Johnson 和 Vitaly Shmatikov。全基因组关联研究中的隐私保护数据探索。载于《第*19*届*ACM SIGKDD*知识发现与数据挖掘国际会议论文集》，第1079–1087页。ACM，2013年。Bert Kramer。用于评估荷兰非寿险公司的有序Logit模型。《经济学家》，144(1):79–91，1996年。Arvind Narayanan 和 Vitaly Shmatikov。大型数据集的稳健去匿名化（如何破解Netflix奖数据集的匿名性）。德克萨斯大学奥斯汀分校，2008年。Shyam Narayanan。隐私保护的高维假设检验。载于学习理论会议，第3979–4027页。PMLR，2022年。Thˆong T Nguyˆen 和 Siu Cheung Hui。离散时间生存分析的差分隐私回归。载于*2017*年*ACM*信息与知识管理会议论文集，第1199–1208页。ACM，2017年。Kobbi Nissim、Sofya Raskhodnikova 和 Adam Smith。隐私数据分析中的平滑敏感度与抽样。载于第三十九届*ACM*计算理论年度研讨会论文集，第75–84页。ACM，2007年。V´ıctor Pe˜na 和 Andr´es F Barrientos。采用子采样聚合随机响应机制的差分隐私假设检验。*arXiv*预印本 *arXiv:2208.06803*，2022年。John Rice。数理统计与数据分析。Brooks/Cole，加利福尼亚州贝尔蒙特，2007年。Ryan Rogers 和 Daniel Kifer。一类新型隐私卡方假设检验。载于人工智能与统计学，第991–1000页，2017年。Or Sheffet。差分隐私普通最小二乘法。载于第*34*届国际机器学习会议论文集-第*70*卷，第3105–3114页。JMLR.org，2017年。Adam Smith。高效的差分隐私点估计量。*arXiv*预印本 *arXiv:0809.4794*，2008年。Adam Smith。具有最优收敛速率的隐私保护统计估计。载于第四十三届*ACM*计算理论年度研讨会论文集，第813–822页。ACM，2011年。Eftychia Solea。正态随机变量的差分隐私假设检验。硕士论文，宾夕法尼亚州立大学，2014年。Marika Swanberg、Ira Globus-Harris、Iris Griffith、Anna Ritz、Adam Groce 和 Andrew Bray。改进的差分隐私方差分析。《隐私增强技术论文集》，2019(3):310–330，2019年。Latanya Sweeney。k-匿名性：一种保护隐私的模型。《不确定性、模糊性与知识系统国际期刊》，10(05):557–570，2002年。Majbah Uddin 和 Nathan Huynh。影响危险品运输卡车交通事故伤害严重程度的因素。《国际交通科学与技术期刊》，7(1):1–9，2018年。

Caroline Uhlerop、Aleksandra Slavkovi´c 和 Stephen E Fienberg。用于全基因组关联研究的隐私保护数据共享。《隐私与保密杂志》，5(1):137，2013年。Duy Vu 和 Aleksandra Slavkovic。临床试验数据的差分隐私：初步评估。载于数据挖掘研讨会，*2009*年。*ICDMW'09*。*IEEE*国际会议，第138–143页。IEEE，2009年。Yue Wang、Jaewoo Lee 和 Daniel Kifer。重新审视分类数据的差分隐私假设检验。*arXiv*预印本 *arXiv:1511.03376*，2015年。Yue Wang、Daniel Kifer、Jaewoo Lee 和 Vishesh Karwa。差分隐私下的统计近似分布。《隐私与保密杂志》，8(1)，2018年。Larry Wasserman 和 Shuheng Zhou。差分隐私的统计框架。《美国统计学会会刊》，105(489):375–389，2010年。

A 证明

这里列出正文中省略的证明。

A.1 第3节的证明

现在我们证明，t　　我们的检验的样本复杂度比公开检验高出一个 $\mathcal{O}(1/\varepsilon)$ 倍的因子　　.

定理3.3。 我们的检验要达到 ρ 检验功效所需的样本复杂度为

$$n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

证明。 考虑一个有两处变化的替代检验：我们使用拉普拉斯噪声而不是 Tulap 噪声，并且使用阈值以下的比例而非计数作为检验统计量。在算法1的第6行中，我们使用替代检验统计量

$$\tilde{z} = \frac{a + \mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}{m} = \frac{a}{m} + \frac{\mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)}{m}.$$

根据定理 2.4 和 2.8，可保证此输出满足 ε-差分隐私。其敏感度为 1，因为更改数据集中的一行最多只会改变一个组的 p 值，因此最多会使 a 改变 1。

设 $L = $ 拉普拉斯分布$(\varepsilon)\ m$。那么，存在某个 $\varepsilon = \varepsilon^*$、某个子组数量 m以及某个子组大小 n，使得 $L =$ 拉普拉斯分布$(\frac{1}{\varepsilon^*})\ m$ 足够小，从而可以用样本量为 mn的样本达到检验功效 ρ，其中 n 是每组中的数据点数量， m 是组的数量。

现在设 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon^*}{k}$和 $m' = km$。根据拉普拉斯分布的缩放性质，我们有　　e

$$\frac{\mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon'}\right)}{m'} = \frac{\mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon^*/k}\right)}{km} = \frac{k\mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon^*}\right)}{km} = \frac{\mathrm{Lap}\left(\frac{1}{\varepsilon^*}\right)}{m} = L.$$

这意味着，如果每组中的数据点数量 n保持不变，那么对于 $\varepsilon' = \frac{\varepsilon^*}{k}$，即使组的数量增加到原来的 k 倍，所添加的噪声仍然是 L。

接下来，我们需要考虑额外的组如何影响项 $\frac{a}{m}$（该项与 ε 无关）。注意，$\mathrm{E}[\frac{a}{m}] = \theta$ 是一个常数，因此改变组的数量不会影响这个期望。但 $\mathrm{Var}[\frac{a}{m}] = \frac{\theta}{(1-\theta)\ m}$，所以将组数增加 k 倍，会使方差降低 k 倍。因此， $\tilde{z}$的分布均值不变，仍然服从二项分布，但方差会更低。这意味着检验功效必然会提高。

这一分析表明，如果在样本量为 mn 时，使用 ε 可以达到检验功效 ρ，那么使用 ε/k 时，也能在小于或等于 kmn 的样本量下达到这一检验功效。换言之，样本复杂度与 ε 成反比。这表明，这种替代检验的样本复杂度为 $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$.。我们的检验使用均匀最强的 ε-差分隐私二项检验，而非简单的拉普拉斯噪声，因此其样本复杂度也必须为 $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$。 □

现在我们计算该检验的精确检验功效（而非渐近检验功效）。

令 $f_X(x)$ 和 $F_X(x)$ 分别表示随机变量 X 的概率密度函数（PDF）和累积分布函数（CDF）。现在我们来证明关于相关随机变量的累积分布函数的两个引理。

引理 A.1. 设 θ 为显著性水平为 α_0时，在每个 m 子样本中进行的公开检验 τ 的检验功效。设 $A \sim$ 二项分布(m, θ)，并设 $Z|A \sim \mathrm{Tulap}(A, e^{-\varepsilon})$。则 Z 的累积分布函数为

$$F_Z(z) = \sum_{i=0}^{M} F_{Z|A}(z|i)\ f_A(i).$$

证明。设 $f(a,\ z)$ 为 A 和 Z 的联合概率密度函数。则 Z的累积分布函数 is

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_{-\infty}^{z} f_Z(t)\ dt \\ &= \int_{-\infty}^{z} \sum_{i=0}^{M} f(i,t)\ dt \\ &= \sum_{i=0}^{M} \int_{-\infty}^{z} f_{Z|A}(t|i)\ f_A(i)\ dt \\ &= \sum_{i=0}^{M} F_{Z|A}(z|i)\ f_A(i) \end{aligned}$$

□

引理 A.2。令 $B \sim$ 二项分布(m, α_0) 和 $N \sim \mathrm{Tulap}(0, e^{-\varepsilon})$。则 $B+N$ 的累积分布函数为

$$F_{B+N}(t) = \sum_{i=0}^{M} f_B(i) F_N(i-t).$$

证明。根据卷积，$B+N$ 的累积分布函数为

$$\begin{aligned} F_{B+N}(t) &= P(B+N \le t) \\ &= \sum_{i=0}^{M} \int_{t-i}^{\infty} f_B(i) f_N(x)\ dx \\ &= \sum_{i=0}^{M} f_B(i)(1 - F_N(t-i)) \\ &= \sum_{i=0}^{M} f_B(i) F_N(i-t) \end{aligned}$$

□

定理 3.4。令 θ 表示在每个 m 子样本中，显著性水平为α_0的公开检验 τ 的检验功效。令 $A \sim$ 二项分布(m, θ)、$Z|A \sim \mathrm{Tulap}(A, e^{-\varepsilon})$、$B \sim$ 二项分布(m, α_0)和 $N \sim \mathrm{Tulap}(0, e^{-\varepsilon})$。则我们的检验的检验功效为

$$\mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta) = (1 - F_Z(F^{-1}_{B+N}(1-\alpha))).$$

证明。令 W_i 为一个随机变量：若 $p_i < \alpha_0$ 则取值为 1，否则取值为 0。因此它服从$W_i \sim$ 伯努利分布(θ)。那么，$A = \sum_{i=1}^{m} W_i \sim$ 二项分布(m, θ)表示小于 α_0 的 p 值的数量，而$Z \mid A \sim \mathrm{Tulap}(A, e^{-\varepsilon})$是 A的差分隐私估计。

$B \sim$二项分布 $(M,\ \alpha_0)$ 表示零假设下小于 α_0 的 p 值个数，而 $N \sim$Tulap$(0,\ e^{-\varepsilon},\ 0)$ 是维持 ε-差分隐私所需的 Tulap 噪声量。对于任何有效的假设检验，在零假设下，$\theta = P(p_i < \alpha_0) \le \alpha_0$。因此，检验我们感兴趣的假设等价于检验

$$H_0 : \theta \le \alpha_0 \quad \text{and} \quad H_A : \theta > \alpha_0.$$

该检验的 p 值为

$$p(Z) = P(B+N \ge Z \mid Z).$$

因此，此检验的检验功效为

$$\begin{aligned} P(p(Z) \le \alpha) &= P(1 - F_{B+N}(Z) \le \alpha) \\ &= P(Z \ge F^{-1}_{B+N}(1-\alpha)) \\ &= (1 - F_Z(F^{-1}_{B+N}(1-\alpha))). \end{aligned}$$

由引理 A.1 和 A.2，$F_Z(z) = \sum_{i=0}^{M} F_{Z|A}(z|i)\ f_A(i)$ 和 $F_{B+N}(t) = \sum_{i=0}^{M} f_B(i)F_N(i-t)$。证毕。

□

固定公开检验后，我们便得到以下推论。由此可计算隐私成本的界限，这里的隐私成本是指与非隐私检验相比所需数据量的增加。

推论 3.5. 假设某个公开假设检验 τ 在任意数据选择下，要达到显著性水平 α_0 和检验功效 θ，最多需要 n 个数据点。那么，为使隐私参数为 ε的隐私检验达到显著性水平 α和检验功效 ρ，所需数据点数的上界为 $n\tilde{m}$，其中 $\tilde{m}$ 是满足下式的最小 m

$$\rho \leq \mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta)$$

证明。考虑一个数据库，它被划分为 $\tilde{m}$ 个子集，每个子集包含 n个数据点。在每个子集上运行公开假设检验时，p 值超过阈值 α_0 的真实概率为某个 $\theta^* \geq \theta$。考虑$\mathcal{P}(\varepsilon,\ \alpha,\ \tilde{m},\ \alpha_0,\ \theta^*)$。由于备择假设下 Z 的分布会进一步偏离零假设分布（其中心现在为 $\tilde{m}\theta^* \geq \tilde{m}\theta \geq \tilde{m}\alpha_0$），因此可得

$$\mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, \tilde{m}, \alpha_0, \theta^*) \geq \mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, \tilde{m}, \alpha_0, \theta).$$

现在令 m' 为满足以下条件的最小 m

$$\rho \leq \mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta^*).$$

由于 $\mathcal{P}$ 是 m的严格递增函数，因此可得 $m' \leq \tilde{m}$。

现在考虑隐私检验达到 ρ 检验功效所需的实际数据点数量。也就是说，在所有 α_0 和 m的取值下，检验都能达到满检验功效所需的最少数据点数量。形式化地，我们定义

$$m^* = \arg\min_{m} \{\rho \leq \mathcal{P}(\varepsilon, \alpha, m, \alpha_0, \theta^*) \mid m \in \mathbb{N}, \alpha_0 \in [0,1]\}.$$

由于检验使用 $m'n$ 个数据点即可达到 ρ 检验功效，而达到 ρ 检验功效所需的最少数据点数量为 m^*n，因此可得 $m'n \geq m^*n$。结合前面的不等式可得 $\tilde{m}n \geq m^*n$。

□

A.2 第4节的证明

Awan 和 Slavkovi´c [2018] 的结果可用于证明 ToT 的检验功效高于 PB 框架。

这里我们计算 Pe˜na 和 Barrientos [2022]提出的检验功效的解析表达式。

定理 A.3. 设 θ 为显著性水平为 α_0的公开检验 τ 的检验功效。设 $f_{i,p,m}$ 为泊松二项分布的概率质量函数，其成功概率向量中，p 重复 i 次，且$1-p$ 重复 $m-i$ 次。那么，*PB* 检验的检验功效为

$$\mathcal{P}_{PB}(\varepsilon, \alpha, m, p, \alpha_0, \theta) = \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=\frac{m+1}{2}}^{m} f_{i,p,m}(j) \binom{m}{i} \theta^i (1-\theta)^{m-i}.$$

˜证明。设 W 为公开检验被拒绝的子样本数，W 为应用随机响应机制后子检验被拒绝的子样本数。我们首先考虑在给定 $W = i$的条件下，H_0 被拒绝的概率；当且仅当 $\tilde{W} > \frac{m-1}{2}$ 时会发生这种情况。概率˜为 $W = j$，其服从成功概率向量为以下各项的泊松二项分布

$$(\underbrace{p, \ldots, p}_{i \text{ times}}, \underbrace{1-p, \ldots, 1-p}_{m-i \text{ times}}).$$

我们用 $f_{i,\ p,\ m}$ 表示该分布。

现在考虑整体检验。 $W=i$ 的概率服从大小为 m、概率为 θ的二项分布。再应用全概率定律可得,

$$\begin{aligned} Pr\left(\tilde{W}>\frac{m-1}{2}\right) &= \sum_{i=0}^{m} Pr\left(\tilde{W}>\frac{m-1}{2} \mid W=i\right) Pr\left(W=i\right) \\ &= \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=\frac{m+1}{2}}^{m} Pr\left(\tilde{W}=j \mid W=i\right) \binom{m}{i}\theta^{i}(1-\theta)^{m-i} \\ &= \sum_{i=0}^{m}\sum_{j=\frac{m+1}{2}}^{m} f_{i,p,m}(j)\binom{m}{i}\theta^{i}(1-\theta)^{m-i}. \end{aligned}$$

注意，PB 优化只会选择奇数 m，从而确保 $\frac{m+1}{2}$ 是整数。至此，证明完毕。

□

A.3 第 5 节的证明

这里我们计算一个解析表达式，用于表示检验 d 维高斯分布偏离给定均值时，公开检验的检验功效。

定理 5.1。 设 F_0 是 $\chi^2(df=d)$ 的累积分布函数， F_A 是 $\chi^2\left(df=d,\lambda=n\sum_{j=1}^{d}\mu_j^2\right)$ 的累积分布函数，其中 n 是样本量， μ_j 是 $\boldsymbol{\mu}$ 的 j^{th} 个条目。则显著性水平为 α 的公开检验的检验功效为 $1-F_A(F_0^{-1}(1-\alpha)$。

证明。 首先，注意到 $\bar{X}_j\sim\mathcal{N}\left(\mu_j,\sigma=\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$。因此， $\sqrt{n}\bar{X}_j\sim\mathcal{N}(\sqrt{n}\mu_j,\ \sigma=1)$。由此可得，对于检验统计量,

$$Z=n\sum_{j=1}^{d}\bar{X}_j^2=\sum_{j=1}^{d}(\sqrt{n}\bar{X}_j)^2\sim\chi^2(df=d,\lambda).$$

在零假设下， $\lambda=0$。但如果 $\boldsymbol{\mu}\neq\mathbf{0}$,

$$\lambda=\sum_{j=1}^{d}(\sqrt{n}\mu_j)^2=n\sum_{j=1}^{d}\mu_j^2.$$

令 Z 为观测到的检验统计量， P 为相应的 p 值。对于显著性水平 α，检验功效因此为

$$\begin{aligned} Pr(P\leq\alpha) &= Pr(F_0(Z)\geq 1-\alpha) \\ &= Pr(Z\geq F_0^{-1}(1-\alpha) \\ &= 1-F_A(F_0^{-1}(1-\alpha)). \end{aligned}$$

□

这里我们计算 Canonne 等人的检验的第一类错误下界。

定理 A.4. 令 $L\sim$ 拉普拉斯分布(b)，其中

$$b=\left(5\Delta_\delta^G+\frac{432d}{\varepsilon}\ln\frac{nd}{\delta}\sqrt{\ln\frac{n}{\delta}\cdot\ln\frac{5}{4\delta}}\right)/\varepsilon$$

且 Δ_δ^G 的定义与 *Canonne* 等人 *[2020]* 中算法 *4* 的定义相同。令 $Z\sim\mathcal{N}(0,\ \sigma=n\sqrt{2d})$。则 *Canonne* 等人的算法的第一类错误下界为

$$1-F_{Z+L}\left(\frac{n^2\gamma^2}{324}\right).$$

证明。 我们从 Canonne 等人算法 4 的第 2 阶段开始。在第 1 阶段，任何未通过的条件都会导致拒绝零假设，这意味着最终步骤产生的第一类错误构成总体第一类错误的一个下界。在第 2 阶段，对于每一行 $j \in \{1, \dots, n\}$，算法要么从 $\mathcal{N}_d(\mathbf{0},\ \mathbb{I}_d)$ 中抽取 $\hat{X}^{(j)}$，要么将 $\hat{X}^{(j)} = X^{(j)}$ 设为原始行。但在零假设下，$X^{(j)} \sim \mathcal{N}_d(\mathbf{0},\ \mathbb{I}_d)$，因此无论哪种情况，$\hat{X}^{(j)} \sim \mathcal{N}_d(\mathbf{0},\ \mathbb{I}_d)$。

因此，在零假设下，根据作者的定理 B.2，在零假设下，$T(\hat{X}) \sim \mathcal{N}(0,\ \sigma = n\sqrt{2d})$。在第 3 阶段，算法随后向 $T(X)$ 添加取自拉普拉斯分布 $L \sim \text{Laplace}(b)$ 的噪声，其中

$$b = \left(5\Delta_\delta^G + \frac{432d}{\varepsilon} \ln \frac{nd}{\delta} \sqrt{\ln \frac{n}{\delta} \cdot \ln \frac{5}{4\delta}}\right) / \varepsilon$$

$$\Delta_\delta^G = 144\left(d \ln \frac{d}{\delta} + \frac{d}{n\varepsilon^2} \ln^2 \frac{1}{\delta} + \sqrt{nd} \sqrt{\ln \frac{d}{\delta} \cdot \ln \frac{n}{\delta}} + \frac{\sqrt{d}}{\varepsilon} \ln \frac{1}{\delta} \sqrt{\ln \frac{n}{\delta}}\right) \ln \frac{nd}{\delta}.$$

当且仅当 $T(\hat{X}) + L > \frac{n^2\gamma^2}{324}$ 时，拒绝零假设。令 $Z \sim \mathcal{N}(0, \sigma = n\sqrt{2d})$，则该检验的第一类错误下界为

$$\begin{aligned} P\left(T(\hat{X}) + L > \frac{n^2\gamma^2}{324} \mid H_0\right) &= 1 - P\left(Z + L \le \frac{n^2\gamma^2}{324}\right) \\ &= 1 - F_{Z+L}\left(\frac{n^2\gamma^2}{324}\right). \end{aligned}$$

□

B 补充图

此处包含补充图。

B.1 Pe˜na-Barrientos 框架

图 5 展示了 Awan 和 Slavkovi´c[2018] 以及 Pe˜na 和 Barrientos [2022] 提出的二项检验的理论功效对比。图 6 和图 7 则展示了 Pe˜na 和 Barrientos[2022] 框架与检验之检验在其他设置下的对比。




图 5：设 m 和 α_0 为在给定 ε下，根据 $\alpha = 0.05$ 的“低检验功效”设定建议为 PB 检验选取的参数。该图展示了对于数据$\mathbf{x} \sim$ 二项分布(m, θ)，针对假设 H_0： $\theta \le \alpha_0$和 H_A： $\theta > \alpha_0$ 的检验功效随 θ 变化的情况，涵盖 Awan 和 Slavkovi´c [2018] 以及 Pe˜na 和 Barrientos [2022]提出的二项检验。左图展示 $\varepsilon = 0.1$，右图展示$\varepsilon = 1$。




图 6：在不同数据库大小 n 、 $\alpha = 0.05$ 条件下，Pe˜na、Barrientos [2022] 、检验的检验和 z 检验的检验功效比较。效应量为 $\mu/\sigma = 1$ ，隐私参数为 $\varepsilon = 1$。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n ，优化检验的检验的 m 和 α_0 ，使其达到目标检验功效 $\rho = 0.9$。




图 7：在不同数据库大小 n 、 $\alpha = 0.05$ 条件下，Pe˜na、Barrientos [2022] 、检验的检验和含非隐私组的单因素方差分析的检验功效比较。效应量为 $\eta = 4$ ，隐私参数为 $\varepsilon = 1$。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n ，优化检验的检验的 m 和 α_0 ，使其达到目标检验功效 $\rho = 0.9$。

B.2 多元正态数据

图 8 比较了图 3 中两种检验的经验第一类错误率。图 9 至图 12 进一步比较了 Canonne 等人 [2020] 与 ToT 在不同维度 d、效应量 $\boldsymbol{\mu}$和隐私参数 ε下的检验功效。




图 8：Canonne 等人 [2020] 与不同样本量 n下检验的检验之间的第一类错误比较。对于检验的检验，维度为 $d = 100$、$\varepsilon = 1$和 α，公开检验设置为 0。5。按照第 3.4 节中的讨论，我们针对每个 n，以目标 $\rho = 0.9$优化检验的检验的 m 和 α_0。




图 9：Canonne 等人 [2020] 与不同样本量 n下检验的检验之间的检验功效比较。对于所有 $i \neq 1$，真实均值为 $\mu_1 = 0.1$ 和 $\mu_i = 0$。维度为 $d = 100$、$\varepsilon = 1$和 α，检验的检验的公开检验设置为与 Canonne 等人 [2020] 检验的第一类错误相匹配。按照第 3.4 节中的讨论，我们针对每个 n，以目标 $\rho = 0.9$优化检验的检验的 m 和α_0。




图 10：Canonne 等人 [2020] 与检验的检验在不同样本量 n下的检验功效比较。对于 $i <= 20$，真实均值为 $\mu_i = 0.1$，否则为 $\mu_i = 0$。维度为 $d = 60$、$\varepsilon = 1$和 α；公开检验的设置使其第一类错误与 Canonne 等人 [2020] 检验的第一类错误相匹配。按照第 3.4 节的讨论，我们针对检验的检验在每个 n 下优化m 和 α_0，目标为 $\rho = 0.9$。




图11：Canonne 等人 [2020] 与检验的检验在不同样本量 n下的检验功效比较。对于 $i <= 20$ ，真实均值为 $\mu_i = 0.3$ ；其他情况下为 $\mu_i = 0$ 。维度为 $d = 60$、 $\varepsilon = 1$和 α 。检验的检验和公开检验的设置旨在与 Canonne 等人的 [2020] 检验的第一类错误相匹配。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n 优化检验的检验的 m和 α_0 ，目标为 $n \leq 50$ 时取 $\rho = 0.9$ ， $n > 50$时取 $\rho = 0.99$。




图12：Canonne 等人 [2020] 与检验的检验在不同样本量n下的检验功效比较。对于 $i <= 20$ ，真实均值为 $\mu_i = 0.3$ ；其他情况下为 $\mu_i = 0$ 。维度为 $d = 60$、 $\varepsilon = 0.5$和 α。检验的检验和公开检验的设置旨在与 Canonne 等人的 [2020] 检验的第一类错误相匹配。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n 优化检验的检验的 m 和 α_0 ，目标为 $n \leq 100$时取 $\rho = 0.9$ ， $n > 100$时取 $\rho = 0.99$ 。

B.3 单因素方差分析

图13至图16进一步比较了 Couch 等人 [2019]、Swanberg 等人 [2019], 和 ToT 在不同参数选择下的表现。图13和图14比较的是具有 $g = 2$ 组、效应量不同的情况，而图15和图16比较的是具有 $g = 3$ 组的情况。




图13：Couch 等人 [2019]、Swanberg 等人 [2019], 与检验的检验在数据库大小 n的不同取值下的检验功效比较。效应量为 $\eta = 0.5$，隐私参数为 $\varepsilon = 1$，组数为$g = 2$。所有组的大小相等，且 $\alpha = 0.05$。除公开检验外，所有功效曲线均通过模拟估计。我们按照第 3.4 节所述，在每个 n 处为检验的检验优化 m 和 α_0 ，目标为$\rho = 0.9$。




图14：Couch 等人 [2019]、Swanberg 等人 [2019], 与检验的检验在数据库大小 n取不同值时的功效比较。效应量为 $\eta = 25$，隐私参数为 $\varepsilon = 0.1$，组数为 $g = 2$。所有组大小相等，且 $\alpha = 0.05$。除公开检验外，所有功效曲线均通过模拟估计。我们按照第 3.4 节中的讨论，在每个 n 下为检验的检验优化 m 和 α_0 ，目标为$\rho = 0.9$。




图15：在不同数据库大小 n下，比较 Couch 等人 [2019]、Swanberg 等人 [2019], 和检验的检验的检验功效。效应量为 $\eta = 0.35$，隐私参数为 $\varepsilon = 1$，组数为$g = 3$。所有组的大小相同，且 $\alpha = 0.05$。除公开检验外，所有功效曲线均通过模拟估计。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n 优化检验的检验的 m 和 α_0 ，目标为 $\rho = 0.9$。




图16：在不同数据库大小 n下，比较 Couch 等人 [2019]、Swanberg 等人 [2019], 和检验的检验的检验功效。效应量为 $\eta = 25$，隐私参数为 $\varepsilon = 0.1$，组数为$g = 3$。所有组的大小相同，且 $\alpha = 0.05$。除公开检验外，所有功效曲线均通过模拟估计。按照第 3.4 节所述，我们针对每个 n 优化检验的检验的 m 和 α_0 ，目标为 $\rho = 0.9$。