arXiv:2305.00845v1 [stat.AP] 1 May 2023

融合试验数据以比较治疗方案：单跨度与多跨度桥接

Bonnie E. Shook-Sa[1*]、**Paul N. Zivich**[2,3]**,Samuel P. Rosin**[1]**,Jessie K. Edwards**[2]**,Adaora A. Adimora**[2,4]**,Michael G. Hudgens**[1]**,和 Stephen R. Cole**[2]

[1]北卡罗来纳大学教堂山分校生物统计学系，北卡罗来纳州教堂山，美国[2]北卡罗来纳大学教堂山分校流行病学系，美国[3]北卡罗来纳大学教堂山分校医学院全球卫生与传染病研究所，美国[4]北卡罗来纳大学教堂山分校医学院，美国

*bshooksa@email.unc.edu

2023年5月2日

摘要

虽然随机对照试验（RCTs）对于确立新疗法的疗效至关重要，但仅凭试验数据能够直接进行的比较仍存在局限。随机对照试验仅包含少数几个对照组，而且通常将新疗法与已证实有效的标准治疗进行比较。有时，人们希望估计新疗法相对于未在同一试验中评估的治疗的疗效，例如安慰剂或在另一项试验中评估的替代疗法。此类多项研究比较颇具挑战性，因为试验人群之间可能存在差异，从而影响结局。本文考察了两种桥接估计量，利用数据融合方法校正试验人群中已测量的差异，以便比较在不同试验中评估的治疗。多跨度估计量利用两项试验间的一个共同治疗组，而单跨度估计量则不要求存在共同治疗组。本文还提出了一种诊断统计量，用于比较标准化共同治疗组中的结局。通过模拟对这两种估计量进行了比较；当识别假设成立时，两者均表现出极小的经验偏倚，且置信区间覆盖率达到名义水平。研究还使用艾滋病临床试验组320和388的数据，比较了晚期HIV患者接受双药与四药抗逆转录病毒疗法对CD4细胞计数的影响。单跨度方法所需的识别假设更少，并且在模拟和实际应用中效率更高。

关键词：因果推断；可推广性；可迁移性。

1 引言

随机对照试验（RCTs）对于确立新疗法的疗效至关重要，但利用单项试验的数据能够进行哪些比较存在局限。出于伦理原因，试验通常仅比较一种新疗法与已被证实有效的标准治疗。受资源限制，随机对照试验通常只纳入少数组别。然而，有时人们希望将新疗法与在另一项试验中评估过的治疗进行比较，例如安慰剂或既往疗法（Mauri and D'Agostino Sr, 2017）。这类比较可以通过跨多项研究进行推断来实现。然而，在这种情况下，简单的传递性论证可能会产生误导，因为它们忽略了试验人群之间可能影响结局风险的差异（Catalá-López et al., 2014）。当两项试验具有共同治疗组时，一种估计治疗效应的方法是网状荟萃分析（Lumley, 2002）。如果关注组分别在不同的单项试验中进行评估，这种方法便隐含地假设各试验间不存在会影响结局风险的参与者特征差异。近年来，研究人员估计了

安慰剂反事实，从而获得试验中安慰剂组关注结局的标准化估计，以便与另一项试验中的活性对照进行比较（Hughes, 2020; Donnell, 2022）。虽然这种方法能够考虑试验人群间的部分差异，但协变量调整仅限于少数离散协变量。研究人员还提出了贝叶斯方法来估计安慰剂反事实，但这类方法需要依赖专家知识或先验数据所提供的强假设（Glidden et al., 2020）。Zhang et al. (2016) 提出了一些在具有共同治疗组的试验间比较治疗的方法；这些方法采用结构嵌套模型和双重稳健方法，在点结局场景下考虑试验人群间的差异。Breskin et al. (2021) 提出了一种用于生存时间结局的逆概率加权方法。

桥接治疗比较涉及比较在不同研究中评估的治疗，而这些研究具有共同治疗组（Zivich 等人，2022b）。以往的桥接方法只关注估计量纳入共同治疗组数据的情形（即“多跨度”估计量），而桥接估计量也可以通过忽略共同治疗组数据来构建（即“单跨度”估计量）。Zhang 和 Breskin 估计量以共同治疗组为锚点，对两个关注组进行比较，属于多跨度桥接估计量。对于多跨度估计量，在大样本下，标准化共同治疗组之间的预期差异为零。这一性质使得可以为这些估计量构建诊断检验。Zivich 等人（2022b）针对时间-事件场景中的 Breskin 多跨度估计量提出了这类诊断方法。

本文提出了一种用于桥接治疗比较的单跨度估计量，用于估计意向性治疗（ITT）平均治疗效应（ATE），且不利用共同治疗组。该单跨度估计量不仅可用于上述场景，也适用于试验之间不存在共同治疗组的情形。单跨度估计量采用与多跨度估计量相同类型的调整，但仅应用于关注组。与多跨度估计量相比，单跨度估计量所需的假设更少，因为它只要求识别假设在进行对比的试验组中成立，并忽略共同组或其余组。第 2 节介绍了用于点结局场景的多跨度和单跨度逆概率加权桥接估计量，以及桥接诊断统计量。文中证明了这些桥接估计量和诊断统计量具有一致性和渐近正态性，并给出了一致的方差估计量。第 3 节通过模拟比较了两种桥接方法的偏倚和效率。第 4 节利用艾滋病临床试验组（ACTG）320 和 388 的数据，应用这两种估计量比较两药与四药抗逆转录病毒（ARV）方案治疗 8 周后的 CD4细胞计数均值。第 5 节讨论了每种方法的优点和局限性。附录给出了估计目标的单跨度形式和多跨度形式的识别证明，以及在识别假设成立时，多跨度和单跨度桥接估计量及桥接诊断统计量的一致性与渐近正态性证明。附录还收录了模拟研究和应用的补充表格与图示。GitHub 上提供了实现所提方法的 R 和 Python 代码。

2 方法

2.1 预备知识

假设开展了两项随机对照试验。在试验1中， n_1 参与者被随机分配至治疗 $A \in \{1,2\}$，在试验2中， n_2 参与者被随机分配至治疗 $A \in \{2,3\}$，两项试验共计$n = n_1 + n_2$ 名参与者。令 $R_i \in \{1,2\}$ 表示某个个体 i 分别参加了试验1或试验2。假设试验2的参与者是从目标人群中随机抽取的，而试验1的参与者则是从其他某个人群（非目标人群）中抽取的。在两项试验中，结局 Y 均在单个时间点进行测量。令 Y_i^1表示参与者 i被分配接受治疗 $A = 1$时的潜在结局，即使该分配可能与事实不符。同样，令 Y_i^2和 Y_i^3分别表示参与者 i 在被分配接受治疗 $A = 2$ 和 $A = 3$时的潜在结局，使得在因果一致性下， $Y_i = \sum_{a=1}^{3} I(A_i = a) Y_i^a$；一般而言， $I(g)$ 是一个二元指标，当 g 为真时取1，否则取0。假设对于某些个体，结局 Y可能缺失（即未被观测到）。令变量 M_i 表示结局 Y_i 是否缺失，其中 $M_i = 1$ 表示结局缺失， $M_i = 0$表示其他情况。假设在基线时为全部 n 名参与者收集了协变量向量 X_i。除非另有说明，所有向量均假设为行向量。因此，在试验1中，观测到 n_1 个 $O_i = \{R_i = 1, A_i, M_i, I(M_i = 0)Y_i$的独立同分布（iid）副本 $X_i\}$，其中 $A_i \in \{1,2\}$；在试验2中，观测到 n_2 个 $O_i = \{R_i = 2, A_i, M_i, I(M_i = 0)Y_i$的iid副本 $X_i\}$，其中 $A_i \in \{2,3\}$。假设试验1中的参与者 i 与试验2中的参与者 j 所得观测值相互独立，但不一定同分布。

2.2 识别假设

不失一般性，假设我们关心在目标人群中比较分配至治疗1和治疗3的效果，即估计 $ATE^{3-1} = E(Y^3 \mid R=2) - E(Y^1 \mid R=2)$。注意，该意向治疗参数比较的是治疗分配下的潜在结局，而不论参与者是否遵循所分配的治疗方案。上述 ATE^{3-1} 的表达式表示该估计目标的单跨度形式。或者， ATE^{3-1} 可以改写为多跨度形式： $ATE^{3-1} = E(Y^3 \mid R=2) - E(Y^2 \mid R=2) + E(Y^2 \mid R=2) - E(Y^1 \mid R=2)$。根据表1中的假设， ATE^{3-1} 的两种形式均可识别。证明方法是首先令 $\pi_A(a,r) = Pr(A=a \mid R=r, X)$， $\pi_M(a,r) = Pr(M=0 \mid A=a, R=r, X)$， 以及 $\pi_R = Pr(R=1 \mid X)$。注意， $\pi_A(a,r)$、 $\pi_M(a,r)$和 π_R 均取决于 X ，但为简化记号，此处将其隐去。于是，根据表1中的假设，对于 $a \in \{2,3\}$

$$E(Y^a \mid R=2) = Pr(R=2)^{-1} E\left\{ \frac{1}{\pi_A(a,2)\pi_M(a,2)} I(R=2, A=a, M=0) Y \right\} \tag{1}$$

同理，对于 $a \in \{1,2\}$,

$$E(Y^a \mid R=2) = Pr(R=2)^{-1} E\left\{ \frac{1-\pi_R}{\pi_R \pi_A(a,1)\pi_M(a,1)} I(R=1, A=a, M=0) Y \right\} \tag{2}$$

(1) 和 (2) 的证明见附录。请注意，(1) 和 (2) 右侧的表达式分别可根据目标人群和非焦点人群的观测数据识别。

ATE^{3-1} 的单跨度和多跨度版本可通过对比各自的组成部分来识别，其中 $E(Y^3 \mid R=2)$ 和 $E(Y^1 \mid R=2)$ 分别利用目标人群和非焦点人群的数据识别（图1）。在多跨度形式中， $E(Y^2 \mid R=2)$ 利用各试验的数据分别识别；这些项随后相互抵消，因此多跨度形式等同于单跨度形式。由表1可知，单跨度方法所需的识别假设少于多跨度方法。具体而言，单跨度方法不要求识别假设在共享组中成立。这使得我们能够桥接那些没有共同治疗组的试验，或共享组中治疗的一致性（因果一致性）存疑的试验，例如共享组采用不同治疗版本的试验。




图1：单跨度和多跨度桥接治疗比较。目标人群是将进行推断的人群。这里假设，一个试验中的参与者是来自目标人群的随机样本。非焦点人群是选取另一项试验所依据的人群。

2.3 估计量

可根据第2.2节推导出的 ATE^{3-1} 可识别形式构建单跨度和多跨度桥接估计量。对于每个估计量，使用有限维参数模型估计参与者 i 的结局非缺失概率。不失一般性，考虑在两个试验的每个组内分别拟合模型：单跨度形式对应两个模型（即 $A=1$、 $R=1$ 和 $A=3$、 $R=2$），多跨度形式对应四个模型（即 $A \in \{1,2\}$ 用于 $R=1$， $A \in \{2,3\}$ 用于 $R=2$）。例如，可以拟合模型 $\text{logit}\{Pr(M_i=0 \mid X_i, A_i=a, R_i=r)\} = g_m(X_i)\lambda_q$；其中， λ_q 是组 q 缺失模型中回归系数构成的列向量，分别对应于（$A=1, R=1$）、（$A=2, R=1$）、（$A=2, R=2$）和（$A=3, R=2$），而 $g_m(X_i)$ 表示用户指定的协变量函数 X_i。随后，为每位参与者定义缺失概率逆概率权重： $\hat{}$ $W_{Mi} = \{\text{expit}(g_m(X_i)\hat{}\lambda_q)\}^{-1}$，其中 $\hat{}$ λ_q 是 λ_q 的最大似然估计（MLE）。然后，通过对试验指标 $I(R=2)$ 关于协变量函数进行回归，估计抽样逆优势权重（Westreich等，2017）

表1：多跨度和单跨度形式下平均处理效应的识别假设

		多跨度	单跨度
1. 无测量误差	O 测量无误差 对于具有 $A=a$的参与者 $Y=\sum_a I(A=a)Y^a$	$a\in\{1,2,3\}$	$a\in\{1,3\}$
2. 因果一致性		$a\in\{1,2,3\}$	$a\in\{1,3\}$
3. 条件可交换性 针对缺失	$Y^a\perp M\mid\{A,X,R=r\}$	$a\in\{1,2\}$ 针对 $r=1$, $a\in\{2,3\}$ 针对 $r=2$	$a=1$对于 $r=1$, $a=3$对于 $r=2$
4. 缺失的正值性	$P(M=0\mid A=a,\ X=x,\ R=r)>0$ 对于所有满足 $a,\ x$的 $dF_{AX}(a,\ x)>0$	$a\in\{1,2\}$ 对于 $r=1$, $a\in\{2,3\}$ 适用于 $r=2$	$a=1$针对 $r=1$, $a=3$用于 $r=2$
5. 条件可交换性 用于治疗	$Y^a\perp A\mid\{X,R=r\}$	$a\in\{1,2\}$ 用于 $r=1$, $a\in\{2,3\}$ 针对 $r=2$	$a=1$针对 $r=1$, $a=3$针对 $r=2$
6. 治疗的正值性	$P(A=a\mid R=r,X=x)>0$ 对于所有满足 $dF_{XR}(x,\ r)>0$的 $x,\ r$	$a\in\{1,2\}$ 用于 $r=1$, $a\in\{2,3\}$ 用于 $r=2$	$a=1$用于 $r=1$, $a=3$用于 $r=2$
7. 条件可交换性 用于抽样	$Y^a\perp R\mid X$	$a\in\{1,2,3\}$	$a\in\{1,3\}$
8. 抽样的正值性	$P(R=1\mid X=x)>0$ 对所有 x 使得 $dF_{XR}(x,R=2)>0$		

注： $F_{AX}(a,x)$ 表示在 (a,x) 处取值的 A,X 的累积分布函数（CDF）； $F_{XR}(x,r)$ 表示在 (x,r) 处取值的 X,R 的CDF。

X。例如，可以拟合模型 $\text{logit}\{Pr(R_i=2\mid X_i)\}=g_s(X_i)\gamma_e$； 其中， γ_e 是抽样模型中回归系数构成的列向量，$e\in\{1,2\}$ 分别对应多跨度和单跨度模型，而 $g_s(X_i)$是用户指定的函数。多跨度抽样模型纳入来自$A\in\{1,2,3\}$的数据，而单跨度模型仅纳入来自 $A\in\{1,3\}$的数据。请注意，如果单跨度抽样模型纳入来自 $A=2$的数据，则需要采用不同于表1所列的识别假设。随后，为每位参与者 i 定义估计的抽样逆优势权重：$\hat{}W_{Si}=\exp\{g_s(X_i)\hat{}\gamma_e\}$，其中$\hat{}\gamma_e$是 γ_e的最大似然估计（MLE）。最后，令 $W_{Ai}=\{P(A_i=a\mid R_i=r,X_i)\}^{-1}$ 表示在给定协变量 X_i的条件下，参与者 i 在试验 $r\in\{1,2\}$中被分配至治疗 a 的概率的倒数。请注意，对于每项试验， $P(A_i=a\mid R_i=r,X_i)$ 通常是已知的，但也可以进行估计（例如，使用逻辑回归模型）。此处假设 $P(A_i=a\mid R_i=r,X_i)$已知。表1中的假设5和6允许按 X进行分层随机化，但随机化通常是边际的，并且根据设计，对所有 a， $Y^a\perp A$。将多跨度和单跨度估计量的干扰参数向量分别定义为 $\eta_1=(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4,\gamma_1)$和 $\eta_2=(\lambda_1,\lambda_4,\gamma_2)$。

随后可构造 ATE^{3-1} 的多跨度和单跨度意向治疗桥接估计量，如下所示

$$\widehat{ATE}_m^{3-1}=\{\hat{E}_2(Y^3\mid R=2;\hat{\eta}_1)-\hat{E}_2(Y^2\mid R=2;\hat{\eta}_1)\}+\{\hat{E}_1(Y^2\mid R=2;\hat{\eta}_1)-\hat{E}_1(Y^1\mid R=2;\hat{\eta}_1)\}\quad(3)$$

and

$$\widehat{ATE}_s^{3-1}=\hat{E}_2(Y^3\mid R=2;\hat{\eta}_2)-\hat{E}_1(Y^1\mid R=2;\hat{\eta}_2)\quad(4)$$

其中

$$\hat{E}_2(Y^a\mid R=2;\hat{\eta}_e)=\frac{\sum_{i=1}^n\hat{W}_{Mi}W_{Ai}I(A_i=a)I(R_i=2)I(M_i=0)Y_i}{\sum_{i=1}^n\hat{W}_{Mi}W_{Ai}I(A_i=a)I(R_i=2)I(M_i=0)}$$

and

$$\hat{E}_1(Y^a\mid R=2;\hat{\eta}_e)=\frac{\sum_{i=1}^n\hat{W}_{Mi}\hat{W}_{Si}W_{Ai}I(A_i=a)I(R_i=1)I(M_i=0)Y_i}{\sum_{i=1}^n\hat{W}_{Mi}\hat{W}_{Si}W_{Ai}I(A_i=a)I(R_i=1)I(M_i=0)}$$

分别对于 $e\in\{1,2\}$ 多跨度估计量和单跨度估计量。请注意，$\hat{}E_2(Y^a\mid R=2;\ \hat{}\eta_e)$和$\hat{}E_1(Y^a\mid R=2;\ \hat{}\eta_e)$是与第2.2节中推导出的参数可识别形式相对应的Hajek估计量。该Hajek

估计量 $\hat{E}_1(Y^a \mid R=2;\ \hat{\eta}_e)$的提出源于因果均值（2）的可识别形式，注意到 t

$$E\left\{\frac{(1-\pi_R)I(A=a)I(R=1)I(M=0)}{\pi_R\pi_A(a,1)\pi_M(a,1)}\right\}=\Pr(R=2) \tag{5}$$

类似地，Hajek估计量 $\hat{E}_2(Y^a \mid R=2;\hat{\eta}_e)$ 是根据已识别的因果均值形式（1）构造的。（5）的证明见附录。

多跨度（3）和单跨度（4）估计量都可以表示为无偏估计方程向量的解，因此在满足一组正则条件和第2.2节中的识别假设时，都是 ATE^{3-1} 的一致渐近正态估计量。详情见附录。经验三明治方差估计量通过M 估计获得（Stefanski 和 Boos，2002年）：将缺失模型和抽样模型的估计方程，与反事实均值的估计量 $E(Y^a \mid R=2)$以及（3）或（4）的估计方程堆叠在一起。请注意，如果估计 $P(A_i=a \mid R_i=r,\ X)$，而不是将其视为已知值，那么出于 M 估计的目的，也要将其相应的估计方程一并堆叠。

在多跨度框架中，利用共享组可获得 $E(Y^2 \mid R=2)$ 的两个估计值。定义 $D_m=E(Y^2 \mid R=2)-E(Y^2 \mid R=2)=0$，使其在多跨度形式下满足 $ATE^{3-1}=E(Y^3 \mid R=2)-E(Y^1 \mid R=2)-D_m$。Zivich 等人（2022b）针对生存时间结局的桥接治疗比较提出了一种诊断方法。对于点结局场景下多跨度估计量基本假设的类似诊断统计量，定义为共享组中估计的结局差异，即，

$$\widehat{D}_m=\hat{E}_2(Y^2 \mid R=2;\hat{\eta}_1)-\hat{E}_1(Y^2 \mid R=2;\hat{\eta}_1) \tag{6}$$

当识别假设成立时，诊断统计量 D_m 也可表示为无偏估计方程的解，使得 $\sqrt{n}(\widehat{D}_m-D_m)\to^d N(0,V(D))$。该结果的证明见附录。渐近方差 $V(D)$ 可通过经验三明治方差估计量进行一致估计，并用于构造 D_m 的 Wald 型 95% 置信区间（CI）。若置信区间不包含零，则表明多跨度估计量的基本假设至少有一项不成立。若 95% 置信区间包含零，则支持使用多跨度估计量，但并不能排除其假设不成立的可能性。虽然该诊断用于评估多跨度估计量的基本假设，但在实践中，也可将其与单跨度估计量结合使用，讨论部分将进一步探讨这一点。

3 模拟研究

我们开展了模拟研究，以考察并比较第 2.3 节所述桥接估计量和诊断统计量的经验特性，以及未考虑试验人群差异的朴素估计量。朴素估计量和朴素诊断统计量 ATE_m、ATE_s 和 D_m 分别等于（3）、（4）和（6），其中 $W_{Mi}=W_{Ai}=W_{Si}=1$。

3.1 模拟设置

模拟基于第 4 节中的示例进行设计，旨在比较晚期HIV患者中两药和四药抗逆转录病毒治疗方案对 8 周时CD4细胞计数均值的影响，同时控制 ACTG 320 和 388 试验人群之间的差异（例如，基线CD4分布和注射吸毒（IDU）史分布的差异）。主要模拟基于 $n_1=1000$和 $n_2=400$ 名个体的样本。我们还针对 $n_1=400$、$n_2=1000$ 以及 $n_1=1000$、$n_2=2000$进行了模拟，结果见附录。主要模拟在 R 中进行，并在 Python 中独立重复，代码发布于 GitHub。我们考虑了五种情景，以考察估计量在不同数据生成过程下的表现。模拟场景包括预期各估计量在经验上无偏的设定，以及预期会出现偏倚的设定，详见第 3.2 节。

对于每种情景，均模拟了两个协变量 X_1 和 X_2。表示个体基线注射吸毒史的 X_1，在情景1中按照均值为 0.25 的伯努利分布进行模拟；在情景2–5中则为 $0.5I(R=1)+0.2I(R=2)$。协变量 X_2 表示基线CD4细胞计数，其值等于 0 与一个均值为 θ、标准差为30的正态分布随机变量两者中的最大值。对于情景1，$\theta=175-10X_1$；对于情景2–5 $\theta=175-20X_1+10I(R=2)$。生成了一个均值为0.5的伯努利随机变量 B。治疗 A 定义为：对于满足 $A\in\{1,2\}$ 的 $R=1$ 个体，n_1 个体接受 $A=B+1$；对于满足 $A\in\{2,3\}$ 的 $R=2$ 个体，n_2 个体接受 $A=B+2$。

表 2：各模拟情景下连续潜在结局分布的条件均值 io

情景	μ^1	μ^2	μ^3
1	$50-5X_1+1.1X_2$	$80-5X_1+1.1X_2$	$110-5X_1+1.1X_2$
2	$35-80X_1+1.0X_2$	$30-10X_1+1.1X_2$	$40+20X_1+1.2X_2$
3	$35-80X_1+1.0X_2$	$I(R=1)\{45-10X_1+1.1X_2\}+$ $I(R=2)\{40+10X_1+1.0X_2\}$	$40+20X_1+1.2X_2$
4	$45-80X_1+1.0X_2-30I(R=1)$	$30-10X_1+1.1X_2$	$30+20X_1+1.2X_2+20I(R=2)$
5	$45-80X_1+1.0X_2-30I\ (R=1)$	$30-10X_1+1.1X_2+10I\ (R=1)$	$30+20X_1+1.2X_2+20I\ (R=2)$

注：连续潜在结局 Y^a 定义为零与正态分布随机变量中的较大值，该随机变量在 $a\in\{1,2,3\}$ 下的均值为 μ^a，标准差为 20。对于 $a\in\{1,2,3\}$，二元潜在结局定义为 $I(Y^a>250)$。协变量 X_1 和 X_2 分别为二元变量和连续变量，其分布在情景1与情景2至5之间有所不同。

按如下方式为每位个体生成三种治疗下的潜在结局。首先，通过取0与一个均值为 μ^a 、适用于 $a\in\{1,2,3\}$ 的正态分布随机变量（标准差为20）两者中的最大值，生成随机变量 U^a ；情景1–5中 μ^a 的取值见表2。随后，为治疗 a 构造两类潜在结局：(i) 连续潜在结局，表示8周时的CD4细胞计数，令 $Y^a=U^a$；(ii) 二元潜在结局，表示CD4细胞计数是否大于250，令 $Y^a=I(U^a>250)$。情景1中，通过生成均值为0.15的伯努利随机变量 M，引入结局缺失数据。情景2–5中， M 的期望值为 expit$\{0.5X_1-2.0I(R=1)-2.1I(R=2)\}$，对应的均值分别约为15%和12%，分别适用于 $R=1$ 和 $R=2$。若 $M=1$，结局 Y 缺失；若 $M=0$，则可观察到该结局；连续和二元情形下的结局分别定义为$Y=Y^1I(A=1)+Y^2I(A=2)\ +Y^3I(A=3)$。

对于每种情景，生成了 2000 个模拟样本，并使用 $\widehat{ATE}_m^{3-1}$ 、 $\widehat{ATE}_s^{3-1}$ 、 $\widetilde{\ }^{3-1}$ $\widetilde{\ }^{3-1}$ $\widehat{\ }$ $\sim ATE_m$ 和 ATE_s 估计了 ATE^{3-1} 。此外，还针对每个样本计算了 D_m 和 D_m。在每个研究组分别拟合的逻辑回归模型中纳入协变量 X_1，以估计缺失概率逆权重。抽样逆优势权重通过对两个试验的堆叠数据拟合逻辑回归模型估计，以 X_1 和 X_2 为自变量、 R 为因变量。多跨度桥接估计量的抽样模型纳入了所有观测值，而单跨度模型仅纳入具有 $A\in\{1,3\}$ 的数据。每个估计量的渐近方差均使用 R 中的 geex（Saul 和 Hudgens，2020）及 Python 中的 Delicatessen（Zivich 等人，2022c），通过经验三明治方差估计量进行估计，并计算相应的 95% Wald置信区间。通过对基于数据生成机制从目标人群抽取的 Y^3-Y^1 进行 2000 万次模拟，并取其均值，经验确定了真实的 ATE^{3-1}。在所有情景中，连续结局的估计目标 ATE^{3-1} 约为 60；五种情景下，二元结局的估计目标范围为 0.45 至 0.51。模拟结果根据经验偏倚、平均标准误（渐近标准误）、经验标准误、标准误比（渐近标准误/经验标准误）、均方根误差（$\sqrt{bias^2+ESE^2}$）以及经验95%置信区间覆盖率进行汇总。经验95%置信区间覆盖率是指95%置信区间包含真实值 ATE^{3-1}的模拟样本所占比例。此外，通过计算2000个模拟样本中诊断统计量的均值，以及相应95%置信区间包含零的比例，对诊断统计量进行评估。

3.2 模拟结果

正如预期，估计量的表现因情景而异。 $n_1=1000$和 $n_2=400$ 的模拟结果见图2；连续结局和二元结局的更详细结果分别见表3和表 4。在情景1中，由于两个试验人群的协变量分布相同，且结局数据完全随机缺失，因此朴素估计量和桥接估计量在经验上均无偏，95%置信区间覆盖率也大致达到名义水平。在其余所有情景中，由于 X_1 导致的信息性缺失数据与 X_1 和 X_2导致的效应度量修饰共同作用（这些因素在不同试验中的分布不同），朴素估计量均存在偏倚，且置信区间覆盖率低于名义水平。在情景2中，两种桥接估计量均适当地处理了已测量协变量导致的信息性缺失和效应度量修饰。在这种情况下，两种

估计量在经验上均无偏，95%置信区间覆盖率也大致达到名义水平。在情景3中，共享组违反了抽样条件可交换性假设（即 μ^2 依赖于 R），导致多跨度估计量产生偏倚，且置信区间覆盖率低于名义水平。由于单跨度估计量未利用共享组，因此在这种情况下，该估计量在经验上无偏，置信区间覆盖率达到名义水平。在情景4和情景5中，所有估计量均出现偏倚，且置信区间覆盖率低于名义水平，这是因为关注组违反了抽样条件可交换性假设（即 μ^1 和 μ^3 依赖于 R）。

估计量的精度差异很大。在所有情景中，朴名单跨度估计量和桥接单跨度估计量的平均标准误和经验标准误均小于其多跨度对应估计量。对于所考虑的所有情景和两种结局，桥接单跨度估计量的平均标准误和经验标准误均最小。对于连续结局的所有情景，以及二元结局五种情景中的三种，桥接单跨度估计量的均方根误差也最小。

桥接诊断统计量在模拟中的表现符合预期。在情景3和情景5中，共享组违反了抽样条件可交换性假设；对于连续结局，诊断统计量的均值与零不同，诊断置信区间分别有100%和93%不包含零。对于二元结局，情景3和情景5中分别有100%和68%的诊断置信区间不包含零。在其余情景中，共享组满足抽样条件可交换性假设，诊断统计量约为零，约95%的诊断置信区间包含零。请注意，在情景4中，共享组满足抽样条件可交换性假设，但非共享组不满足，这意味着该诊断未能检测出关注组违反多跨度识别假设的情况。这表明，诊断可用于检测部分、但并非所有违反多跨度识别假设的情况。由于朴素估计量未考虑试验人群之间的差异，朴素诊断的效用有限，在某些情况下还可能产生误导。例如，在情景3中，朴素多跨度诊断值接近零；对于连续结局和二元结局，诊断置信区间分别有93%和88%不包含零，但经验偏倚却相当大。

$n_1 = 400$、 $n_2 = 1000$ 和 $n_1 = 1000$、 $n_2 = 2000$ 情景的结果见附录表A1–A4。当 $n_1 = 400$ 和 $n_2 = 1000$时，经验偏倚与 $n_1 = 1000$、 $n_2 = 400$的情形相似。然而，多跨度和单跨度桥接估计量往往产生更大的平均估计标准误和经验标准误，从而导致更宽的置信区间；在存在偏倚的情形下，95%置信区间覆盖率也略高。当 $n_1 = 1000$和 $n_2 = 2000$时，偏倚也与 $n_1 = 1000$、 $n_2 = 400$ 情形相似。由于目标人群试验中的样本量更大，两种桥接估计量的平均估计标准误和经验标准误均小于 $n_1 = 1000$、 $n_2 = 400$ 情形，进而产生更小的均方根误差。较小的标准误还导致更窄的置信区间，并使存在偏倚的情景中的95%置信区间覆盖率降低。

总之，当存在信息性结局数据缺失，以及基于试验间分布不同的协变量所产生的效应修饰时，朴素估计量的表现较差。在识别假设成立时，桥接估计量表现良好；对于所考虑的所有样本量，其偏倚极小，覆盖率大致等于名义水平。在所考虑的各种情景中，桥接单跨度估计量的精确度明显高于多跨度估计量，并且对共享组中识别假设的违背具有稳健性。该诊断统计量的表现符合预期，检测出了标准化共同治疗组之间结局的差异。

4 示例

本分析旨在比较两药（双联治疗）和四药（四药抗逆转录病毒治疗方案）抗逆转录病毒治疗方案对以下指标的影响：（1）CD4细胞计数均值；（2）晚期HIV患者在8周时CD4计数为 > 250 个细胞/mm^3 的人员比例。由于存在三药（三联治疗）疗法，且研究显示三药疗法的疗效优于两药疗法，因此未开展直接比较两药和四药治疗方案的试验。相反，本研究利用基于ACTG 320和ACTG 388数据的单跨度和多跨度桥接估计量对这些治疗方案进行比较；ACTG 320和ACTG 388是两项随机对照试验，旨在比较晚期HIV患者抗逆转录病毒治疗方案的疗效和安全性。

ACTG 320是一项在美国开展的多中心双盲试验。1156名参与者经随机分配接受双联治疗或三联治疗。双联治疗包括齐多夫定（200毫克，每日三次）、拉米夫定（150毫克，每日两次）和安慰剂。三联治疗使用相同剂量的齐多夫定和拉米夫定，但以茚地那韦（800毫克，每日三次）替代安慰剂。参与者须年满16岁，且在基线前60天内为HIV阳性，CD4计数不超过200个细胞/mm^3 。此外，参与者此前至少接受过3个月的齐多夫定治疗，且此前接受拉米夫定治疗的时间不超过一周。此前接受过蛋白酶抑制剂治疗者不符合入选条件。参与者在基线、第4周、第8周及此后每8周接受评估




图2：按模拟场景划分的经验偏倚：(A) 连续结局 (B) 二元结局 me

。在招募约一年后，由于三联治疗相较于双联治疗具有更好的疗效，研究提前终止。其他入选标准和实施细节见其他文献（Hammer等人，1997）。

ACTG 388是一项在美国和意大利开展的开放标签随机试验，比较了三联抗逆转录病毒治疗方案和四联抗逆转录病毒治疗方案的疗效。517名参与者被随机分配接受三联治疗或两种四药疗法中的一种。三联治疗组接受拉米夫定（150 mg，每日两次）、齐多夫定（300 mg，每日两次）和茚地那韦（800 mg，每日三次）。研究评估了两种不同的四药治疗方案，二者均将茚地那韦的剂量增加至1000 mg每日三次，并分别加入依非韦伦（600 mg，每日一次）或奈非那韦（1250 mg，每日两次）。参与者在筛查时的CD4计数为200个细胞/mm^3 或更低，或血浆HIV-1 RNA水平为80,000 copies/mL或更高。参与者既往未接受抗逆转录病毒治疗，或仅接受过有限的抗逆转录病毒治疗；既往抗逆转录病毒治疗仅限于齐多夫定、司他夫定、去羟肌苷和扎西他滨。参与者在基线、第4周、第8周以及此后每8周接受评估，最长随访时间为96周。有关该试验的更多详情见其他文献（Fischl等人，2003年）。为协调 ACTG 320 和 ACTG 388 的数据，我们确定了协变量的共同水平。基线 CD4 缺失的 3 名参与者被排除在分析之外。结局定义为 8周时的 CD4细胞计数，这是两项研究共同的评估时间点。在第 8 周前死亡的参与者（ACTG 320 中 4 名，ACTG 388 中 1 名）的第 8 周 CD4细胞计数设为 0。如前所述，ACTG 320 要求参与者此前至少接受过 3 个月的齐多夫定治疗，但 ACTG 388 中只有 31 名（9%）参与者此前接受过抗逆转录病毒治疗。该样本量不足以按既往 HIV治疗方案限制 ACTG 388 的样本，这是本分析的一项局限。请注意，本分析仅考虑依非韦伦四联治疗，因为在 ACTG 388 中，该四联治疗被发现优于三联治疗。研究估计，包含奈非那韦的四联治疗不如三联治疗。

表5比较了两项试验的基线特征。两项试验参与者的性别、种族/族裔、注射吸毒史、卡氏评分和年龄的边际分布相似。然而，基线CD4细胞计数存在显著差异，ACTG 388的CD4细胞计数均值高于ACTG 320。由于纳入标准不同，预计各试验的基线CD4分布会有所不同。ACTG 388的参与者符合以下条件之一：

表3：连续结局的模拟汇总结果，$n_1 = 1000$，$n_2 = 400$，2000 次模拟。计算ATE的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和95%置信区间覆盖率。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断统计量	诊断 95%置信区间包含零（%）
1	朴素 MS	-0.1	5.02	4.96	1.01	5.0	95	0.0	94
	朴素 SS	-0.1	3.55	3.51	1.01	3.5	96		
	桥接 MS	-0.1	5.02	4.96	1.01	5.0	95	0.0	95
	桥接 SS	0.0	2.16	2.16	1.00	2.2	95		
2	朴素 MS	17.8	5.65	5.64	1.00	18.7	11	20.3	0
	朴素 SS	38.1	4.30	4.34	0.99	38.3	0		
	桥接 MS	0.0	6.01	5.93	1.01	5.9	96	0.1	95
	桥接 SS	0.0	3.66	3.69	0.99	3.7	95		
3	朴素 多跨度	37.1	5.49	5.51	1.00	37.5	0	1.0	93
	朴素 单跨度	38.1	4.30	4.34	0.99	38.3	0		
	桥接 多跨度	19.1	5.75	5.70	1.01	19.9	9	-19.0	0
	桥接 SS	0.0	3.66	3.69	0.99	3.7	95		
4	朴素 MS	47.8	5.65	5.64	1.00	48.1	0	20.3	0
	朴素 SS	68.0	4.30	4.34	0.99	68.2	0		
	桥接 MS	30.0	6.01	5.93	1.01	30.5	0	0.1	95
	桥接 单跨度	30.0	3.66	3.69	0.99	30.3	0		
5	朴素 MS	57.8	5.65	5.64	1.00	58.1	0	10.3	19
	朴素 SS	68.1	4.30	4.34	0.99	68.2	0		
	桥接 MS	40.0	6.01	5.93	1.01	40.4	0	-9.9	14
	桥接 SS	30.0	3.66	3.69	0.99	30.3	0		

ASE=平均估计标准误；ESE=经验标准误；SER=标准误比（ASE/ESE）；RMSE = 均方根误差；CI = 置信区间；SS=单跨度；MS=多跨度；当覆盖率为95%时，95%置信区间覆盖率的蒙特卡洛标准误为0.5%。

筛查时CD4细胞计数不高于200 cells/mm^3，或血浆HIV-1 RNA水平不低于80,000 copies/mL；而ACTG 320要求CD4细胞计数不高于200 cells/mm^3。

将单跨度和多跨度桥接估计量应用于 ACTG 320 和 ACTG 388 的数据，以比较上述双药与四药（依非韦伦）抗逆转录病毒治疗方案在治疗8周后（1）CD4细胞计数的均值，以及（2）CD4计数为 > 250 cells/mm^3 的人群比例。假定 ACTG 388 的参与者能够代表目标人群，而 ACTG 320 的参与者能够代表非焦点人群。利用两个试验的堆叠数据，通过逻辑回归模型估计抽样逆优势权重；模型以试验指标为因变量，并纳入以下基线协变量：性别（男性与女性）、种族（非西班牙裔黑人与其他）、族裔（西班牙裔与非西班牙裔）、注射吸毒（从未与当前或既往）、卡氏评分类别（< 90、< 100 和 ≥ 90，或100）、年龄和CD4细胞计数。年龄和CD4细胞计数采用限制性三次样条建模，结点设于第5、35、65和95百分位数（Perperoglou 等，2019）。结局变量的缺失率从 ACTG 388 四药治疗组的6.4%到 ACTG 320 双联治疗组的15.4%不等。针对各研究组分别拟合逻辑回归模型，并使用与可迁移性模型相同的一组协变量，估计缺失概率逆权重。在 ACTG 388 的四药疗法组中，卡氏评分类别进行了合并。

由于基线 CD4细胞计数存在观察到的差异，因此对完整的 ACTG 样本以及受限样本（基线 CD4 ≤ 400、≤ 300 和 ≤ 200）进行了分析。附录图 A1 展示了每组权重分布的箱线图。

ACTG 320和388的CD4细胞计数入选标准存在差异，因此在未限制样本中，识别假设值得质疑。若不按基线CD4细胞计数进行限制，共享组在8周时CD4均值的标准化估计存在差异。诊断图（图3B和图4B）清楚地显示了这些差异：对于连续结局和二元结局，共享组CD4均值的估计差异均大于零，且95%置信区间均不包含零

表 4：二元结局的模拟汇总结果，$n_1 = 1000, n_2 = 400$，2000 次模拟。计算 ATE 的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和 95%置信区间覆盖率（以百分比表示）。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断统计量	诊断 95%置信区间包含零（%）
1	朴素 MS	0.1	5.39	5.48	0.98	5.5	94	-0.1	94
	朴素 SS	0.0	3.35	3.33	1.01	3.3	95		
	桥接 MS	0.0	5.40	5.49	0.98	5.5	94	0.0	94
	桥接 SS	0.0	3.04	3.06	0.99	3.1	95		
2	朴素 MS	-4.5	5.46	5.39	1.01	7.0	88	13.8	4
	朴素 单跨度	9.3	3.88	3.88	1.00	10.1	34		
	桥接 多跨度	-0.2	6.47	6.46	1.00	6.5	95	0.2	95
	桥接 SS	0.0	3.81	3.80	1.00	3.8	95		
3	朴素 MS	11.6	5.43	5.37	1.01	12.8	43	-2.4	90
	朴素 SS	9.3	3.88	3.88	1.00	10.1	34		
	桥接 MS	19.6	6.41	6.39	1.00	20.6	14	-19.6	0
	桥接 SS	0.0	3.81	3.80	1.00	3.8	95		
4	朴素 MS	6.9	5.22	5.18	1.01	8.6	74	13.8	4
	朴素 SS	20.7	3.54	3.56	0.99	21.0	0		
	桥接 MS	16.4	6.10	6.11	1.00	17.5	24	0.2	95
	桥接 SS	16.6	3.56	3.58	0.99	16.9	1		
5	朴素 MS	13.2	5.31	5.29	1.00	14.2	30	7.5	53
	朴素 SS	20.7	3.54	3.56	0.99	21.0	0		
	桥接 MS	25.4	6.14	6.18	0.99	26.1	2	-8.8	43
	桥接 SS	16.6	3.56	3.58	0.99	16.9	1		

ASE=平均估计标准误；ESE=经验标准误；SER=标准误比（ASE/ESE）；RMSE = 均方根误差；CI = 置信区间；SS=单跨度；MS=多跨度；当覆盖率为 95% 时，95%置信区间覆盖率的蒙特卡洛标准误为 0.5%。

。诊断结果表明，多跨度估计量的识别假设遭到违反，导致未限制样本中ATE的单跨度估计值与多跨度估计值存在实质性差异（图3A和图4A）。随着基线CD4细胞计数限制逐渐收紧，两种结局的单跨度和多跨度ATE估计值也越来越接近（图3A和图4A）。诊断结果也支持按基线CD4进行限制：当基线CD4限制为 ≤ 200 时，两种结局的诊断结果的95%置信区间均包含零。该阈值与ACTG 320更严格的CD4入选标准一致。与模拟研究中的情况一样，单跨度估计量比多跨度估计量更精确。对于两种结局以及所考察的每个基线CD4限制水平，单跨度置信区间均窄于多跨度置信区间。当数据限制为基线CD4细胞计数为 ≤ 200的参与者时，四药疗法相较于两药疗法对8周时CD4细胞计数的ATE估计值，在连续结局中，单跨度估计量为63.2（95%置信区间：48.0，78.4），多跨度估计量为57.4（95%置信区间：28.7，86.0）。对于二元结局，单跨度和多跨度的ATE估计值分别为0.14（95%置信区间：0.06，0.21）和0.08（95%置信区间：-0.03，0.18）。

5 讨论

有时，人们会希望将一种新疗法与既往疗法或安慰剂进行比较，但通常由于伦理或资源限制，无法在随机试验中直接进行此类比较（Temple 和 Ellenberg，2000）。此外，直接比较在不同试验中评估的治疗可能会产生误导，因为这类比较未能考虑试验人群的差异（Fleming，2008）。要得出有效估计，比较在不同试验中评估的疗法时必须考虑这些差异。在评估新疗法与活性对照相比的效果、但同时关注其相对于安慰剂的疗效的试验中，能够实现跨试验有效比较的方法可能特别有用（Mauri 和 D'Agostino Sr，2017）。

表5：按治疗组划分的 ACTG 320 和 ACTG 388 参与者基线特征

		ACTG 320		ACTG 388	
		Dual	三联治疗	三联治疗	四联治疗（EFZ）
		$n = 579$	$n = 577$	$n = 168$	$n = 173$
Male		485（84%）	471（82%）	129（77%）	143（83%）
西班牙裔		106（18%）	99 (17%)	29 (17%)	35 (20%)
非西班牙裔黑人		165 (28%)	163 (28%)	52 (31%)	54 (31%)
注射吸毒史		93 (16%)	91 (16%)	21 (13%)	25（14%）
卡诺夫斯基评分类别	< 90	108（19%）	106（18%）	32（19%）	22（13%）
	≥ 90, < 100	269（46%）	276（48%）	77 (46%)	90（52%）
	100	202（35%）	195（34%）	59（35%）	61（35%）
Age	中位数（Q1，Q3）	38（33，44）	38 (33, 44)	37 (32, 45)	36 (31, 42)
	均值（标准差）	39 (9)	39 (9)	39 (10)	37（9）
	Min, Max	17, 73	16, 74	19, 76	21, 63
CD4 细胞/mm^3	中位数（Q1，Q3）	70（23，135）	80（24，138）	125（32，226）	96 (32, 199)
	均值（标准差）	85 (70)	89 (70)	160 (154)	147 (151)
	Min, Max	0, 392	0, 348	0, 728	0, 728
	缺失	1	0	1	1

注：依法韦仑=依非韦伦；注射吸毒=注射吸毒；标准差=标准差




图 3：在目标人群（ACTG 388）中比较四药与双药抗逆转录病毒治疗的平均处理效应，单跨度和多跨度估计值及其 95%置信区间：（A）CD4 细胞均值，以及（B）在共同（三药）治疗组中估计的结局差异的诊断图，比较目标人群与非焦点人群，并显示 95%置信区间




图 4：目标（ACTG 388）人群中四药与双药抗逆转录病毒治疗的平均处理效应比较，单跨度和多跨度估计值及其 95%置信区间：（A）CD4计数为 > 250 cells/mm^3 的比例；（B）共同（三药）组中结局估计差异的诊断图及其 95%置信区间，目标人群与非焦点人群的比较

数据融合提供了一个框架，可整合多项研究的数据，以回答任何单项研究子集都无法（或无法同样有效地）回答的问题（Cole等，2022年）。本文考察的单跨度和多跨度桥接估计量属于融合估计量，可比较在不同试验中评估的治疗方案，因此仅凭其中一项试验的数据无法进行此类比较。单跨度估计量所需的识别假设较少，因为它只要求识别假设在直接比较的试验组中成立，而不要求在不相关的共同治疗组或其他试验组中成立。在两项试验没有共同治疗组，或共同治疗组在关键方面存在差异（例如治疗方案不同）时，这一特点尤为有利。此外，在所考察的所有模拟场景和实际应用中，单跨度估计量都比多跨度估计量更精确。

所提出的诊断统计量比较标准化共同治疗组中的结局，因此可评估多跨度估计量所需、而单跨度估计量不需要的识别假设。在实践中，只要两项试验有一个共同治疗组，无论最终采用单跨度估计量还是多跨度估计量，都可以使用该诊断。若将其用于单跨度估计量，该诊断并不能直接提供假设被违反的证据。不过，在共同治疗组中的假设违反很可能与关注组中的假设违反同时发生的情形下，该诊断仍可能有用。

识别假设的有效性对于桥接估计量的应用至关重要。只要可行，就应尽可能协调统一试验的入选标准，并开展敏感性分析，以考察试验人群之间的差异。试验人群之间的关键差异若未被测量，或导致违反抽样正值性假设，都会限制桥接比较的有效性。然而，当试验具有相似的纳入和排除标准，或共享足够多纳入和排除协变量具有可比性的参与者子集时，在所述识别假设下，桥接治疗比较能够对不同试验中评估的疗法的治疗效应进行一致估计。当试验专门为确保可比性而设计时，此类估计量可能尤为适用，例如实施主方案时（Woodcock和LaVange，2017年）。

本研究可在多个方面进一步拓展。尽管本研究采用参数模型来估计缺失概率逆概率权重和抽样逆优势权重，但对于低维离散协变量集，也可以采用非参数方法估计这些权重。机器学习方法可用于估计逆概率。

缺失权重和抽样逆优势权重，这将使估计量对模型设定错误具有更强的稳健性。然而，将机器学习方法用于估计干扰模型参数仍面临一些挑战（Zivich 等，2022a；Chernozhukov 等人，2018）。还可以考虑使用增广逆概率加权估计量，当两个指定模型中的任意一个设定正确时，这类估计量即可保持一致，而不必依赖单一模型的正确设定。

补充材料

用于计算不同估计量及相应标准误估计量的 R 和 Python 代码可在 https://github.com/bonnieshook/BridgedTreatmentComparisons 获取。

参考文献

参考文献

Breskin, A., Cole, S. R., Edwards, J. K., Brookmeyer, R., Eron, J. J., and Adimora, A. A.（2021）。治疗效应的融合设计与估计量。医学统计学，40(13):3124–3137。Catalá-López, F., Hutton, B., and Moher, D.（2014）。随机对照试验中的传递性：如果 b 优于 a，且 c 优于 b，那么 c 是否优于 a？*Revista Espanola de Cardiologia (English ed.)*，67(8):597–602。Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., and Robins, J.（2018）。用于治疗和结构参数的双重／去偏机器学习。计量经济学杂志，21(1):C1–C68。Cole, S. R., Edwards, J. K., Breskin, A., Rosin, S., Zivich, P. N., Shook-Sa, B. E., and Hudgens, M. G.（2022）。两种融合设计与估计量示例。美国流行病学杂志，192(3):467–474。Dahabreh, I. J., Robertson, S. E., Steingrimsson, J. A., Stuart, E. A., and Hernan, M. A.（2020）。将随机试验的推断扩展至新的目标人群。医学统计学，39(14):1999–2014。Donnell, D.（2022）。利用外部试验数据反事实估计卡博特韦长效注射剂相对于安慰剂的疗效。发表于：逆转录病毒与机会性感染大会；2022年2月12日。Fischl, M. A., Ribaudo, H. J., Collier, A. C., Erice, A., Giuliano, M., Dehlinger, M., Eron Jr, J. J., Saag, M. S., Hammer, S. M., Vella, S., et al.（2003）。一项随机试验：比较两种不同的四药抗逆转录病毒治疗方案与一种三药方案，用于晚期人类免疫缺陷病毒病患者。《传染病杂志》，188(5):625–634。Fleming, T. R.（2008）。非劣效试验中的当前问题。医学统计学，27(3):317–332。Glidden, D. V., Stirrup, O. T., and Dunn, D. T.（2020）。一种用于 HIV 感染数量较少的暴露前预防试验的贝叶斯避免感染框架：应用于 DISCOVER试验结果。《柳叶刀·艾滋病》，7(11):e791–e796。Hammer, S. M., Squires, K. E., Hughes, M. D., Grimes, J. M., Demeter, L. M., Currier, J. S., Eron Jr, J. J., Feinberg, J. E., Balfour Jr, H. H., Deyton, L. R., et al.（1997）。一项对照试验：在 HIV感染且 CD4细胞计数每立方毫米不超过 200 个的患者中，比较两种核苷类似物加茚地那韦的方案。《新英格兰医学杂志》，337(11):725–733。Hughes, J.（2020）。为暴露前预防研究构建安慰剂反事实。可访问：https://www.hptn.org/ sites/default/files/inline-files/11_HPTN%202020%20Update%20Webinar_Stats.pdf。Lumley, T.（2002）。用于间接治疗比较的网状荟萃分析。医学统计学，21(16):2313–2324。Mauri, L. and D'Agostino Sr, R. B.（2017）。非劣效试验设计与解释中的挑战。《新英格兰医学杂志》，377(14):1357–1367。Perperoglou, A., Sauerbrei, W., Abrahamowicz, M., and Schmid, M.（2019）。R 中样条函数方法综述。《*BMC*医学研究方法学》，19(1):1–16。Saul, B. C. and Hudgens, M. G.（2020）。使用 geex 在 R 中进行 M 估计演算。《统计软件杂志》，92(2)。Stefanski, L. A. and Boos, D. D.（2002）。M 估计演算。《美国统计学家》，56(1):29–38。Temple, R. and Ellenberg, S. S.（2000）。评估新疗法中的安慰剂对照试验与阳性对照试验。第一部分：伦理与科学问题。《内科学年鉴》，133(6):455–463。Westreich, D., Edwards, J. K., Lesko, C. R., Stuart, E., and Cole, S. R.（2017）。使用抽样逆优势权重实现试验结果的可迁移性。美国流行病学杂志，186(8):1010–1014。

Woodcock, J. and LaVange, L. M.（2017）。用于研究多种疗法、多种疾病或两者兼有的主方案。《新英格兰医学杂志》，377(1):62–70。Yuan, K.-H. and Jennrich, R. I.（1998）。自然条件下估计方程的渐近性质。《多元分析杂志》，65(2):245–260。Zhang, Z., Nie, L., Soon, G., and Hu, Z.（2016）。治疗效应校准的新方法及其在非劣效试验中的应用。《生物统计学》，72(1):20–29。Zivich, P. N., Breskin, A., and Kennedy, E. H.（2022a）。机器学习与因果推断。*Wiley StatsRef*：在线统计学参考资料。Zivich, P. N., Cole, S. R., Edwards, J. K., Shook-Sa, B. E., Breskin, A., and Hudgens, M. G.（2022b）。桥接治疗比较：HIV治疗中的示例应用。*arXiv* 预印本：*2206.04445*。Zivich, P. N., Klose, M., Cole, S. R., Edwards, J. K., and Shook-Sa, B. E.（2022c）。Delicatessen：Python 中的 M 估计。*arXiv* 预印本：*2203.11300*。

致谢

本研究部分经费来自北卡罗来纳大学教堂山分校艾滋病研究中心（CFAR）的发展基金，该中心是由美国国立卫生研究院资助的 P30 AI050410 项目。本研究还获得了美国国立卫生研究院项目编号 R01 AI157758 和 R01 AI085073 的资助。本文内容完全由作者负责，并不一定代表美国国立卫生研究院的官方观点。感谢艾滋病临床试验组统计与数据管理中心首席研究员 Michael Hughes 博士提供公开使用的研究数据，也感谢北卡罗来纳大学教堂山分校的 Mingwei Fei 提供宝贵反馈。

附录

识别证明（第2.2节）

意向治疗参数 ATE^{3-1}可表示为单跨度形式，即 $ATE^{3-1}=E(Y^3 \mid R=2)-E(Y^1 \mid R=2)$，或多跨度形式，即 $ATE^{3-1}=E(Y^3 \mid R=2)-E(Y^2 \mid R=2)+E(Y^2 \mid R=2)-E(Y^1 \mid R=2)$。根据表1中的假设，$ATE^{3-1}$的这两种形式都是可识别的。回顾一下，$\pi_A(a,\ r)=Pr(A=a \mid R=r,\ X)$，$\pi_M(a,\ r)=Pr(M=0 \mid A=a,\ R=r,\ X)$，以及 $\pi_R=Pr(R=1 \mid X)$。那么，对于 $a \in \{2,3\}$

$$
\begin{aligned}
E(Y^a \mid R=2) &= E\left\{\frac{I(A=a)Y^a}{\pi_A(a,2)}\middle| R=2\right\} && \text{(A.1)}\\
&= E\left[E\left\{\frac{I(A=a)Y^a}{\pi_A(a,2)}\middle| R=2,A,X\right\}\middle| R=2\right] && \text{(A.2)}\\
&= E\left[\frac{I(A=a)}{\pi_A(a,2)}E\left\{\frac{I(M=0)Y^a}{\pi_M(a,2)}\middle| R=2,A,X\right\}\middle| R=2\right] && \text{(A.3)}\\
&= E\left\{\frac{I(A=a)I(M=0)Y}{\pi_A(a,2)\pi_M(a,2)}\middle| R=2\right\} && \text{(A.4)}\\
&= Pr(R=2)^{-1}E\left\{\frac{I(A=a)I(M=0)I(R=2)Y}{\pi_A(a,2)\pi_M(a,2)}\right\} && \text{(A.5)}
\end{aligned}
$$

其中，(A.1)由表1中的假设5和6成立，(A.2)由迭代期望成立，(A.3)由假设3和4成立，(A.4)由假设2和迭代期望成立，(A.5)则由条件期望的定义成立。所有步骤均要求假设1成立。注意，(A.5)可根据目标人群的观测数据识别。

同样，对于 $a \in \{1,2\}$，采用与Dahabreh等人（2020年）类似的方法，

$$
\begin{aligned}
E(Y^a \mid R=2)\Pr(R=2) &= E\left(Y^a \mid R=2\right)\Pr(R=2) && \text{(A.6)}\\
&= E\left\{I(R=2)Y^a\right\} && \text{(A.7)}\\
&= E\left[E\left\{I(R=2)Y^a \mid X\right\}\right] && \text{(A.8)}\\
&= E\left[E\left\{I(R=2) \mid X\right\}E\left(Y^a \mid X\right)\right] && \text{(A.9)}\\
&= E\left\{(1-\pi_R)E(Y^a \mid X)\right\} && \text{(A.10)}\\
&= E\left[\frac{1-\pi_R}{\pi_R}E\left\{Y^aI(R=1) \mid X\right\}\right] && \text{(A.11)}\\
&= E\left\{\frac{1-\pi_R}{\pi_R}I(R=1)Y^a\right\} && \text{(A.12)}\\
&= E\left[E\left\{\frac{1-\pi_R}{\pi_R}Y^aI(R=1)\middle| X,R\right\}\right] && \text{(A.13)}\\
&= E\left[\frac{1-\pi_R}{\pi_R}I(R=1)E\left\{\frac{I(A=a)}{\pi_A(a,1)}Y^a\middle| X,R\right\}\right] && \text{(A.14)}\\
&= E\left[E\left\{\frac{1-\pi_R}{\pi_R\pi_A(a,1)}I(R=1)I(A=a)Y^a\middle| X,R,A\right\}\right] && \text{(A.15)}\\
&= E\left[\frac{1-\pi_R}{\pi_R\pi_A(a,1)}I(R=1)I(A=a)E\left\{\frac{I(M=0)}{\pi_M(a,1)}Y^a\middle| X,R,A\right\}\right] && \text{(A.16)}\\
&= E\left\{\frac{1-\pi_R}{\pi_R\pi_A(a,1)\pi_M(a,1)}I(R=1)I(A=a)I(M=0)Y^a\right\} && \text{(A.17)}\\
&= E\left\{\frac{1-\pi_R}{\pi_R\pi_A(a,1)\pi_M(a,1)}I(R=1)I(A=a)I(M=0)Y\right\} && \text{(A.18)}
\end{aligned}
$$

其中，(A.6) 是通过乘以 1 得出的，(A.7) 根据条件期望的定义得出，(A.8) 根据迭代期望得出，(A.9) 根据表1中的假设 7 和 8 得出，(A.10) 根据 π_R 的定义得出，(A.11) 根据假设 7 得出，(A.12) 和 (A.13) 根据迭代期望得出，(A.14) 根据假设 5 和 6 得出，(A.15) 根据迭代期望得出，(A.16) 根据假设 3 和 4 得出，(A.17) 根据迭代期望得出，(A.18) 根据假设 2 得出。所有步骤均要求假设 1 成立。请注意，(A.6) 可根据非焦点人群的观测数据识别。

如第2.2节所述， ATE^{3-1} 的单跨度和多跨度版本可通过对比各自的组成部分来识别，其中 $E(Y^3 \mid R=2)$ 和 $E(Y^1 \mid R=2)$ 分别利用目标人群和非焦点人群的数据进行识别。在多跨度形式中， $E(Y^2 \mid R=2)$ 则分别利用各项试验的数据进行识别。

Hajek估计量的动机（第 2.3 节）

Hajek估计量 $\hat{} E_1(Y^a \mid R=2; \hat{}\eta_e)$ 的动机来自因果均值 (2) 的已识别形式，注意到（采用与 Dahabreh等人 (2020)类似的方法）

$$
\begin{aligned}
& E\left\{\frac{(1-\pi_R) I(A=a) I(R=1) I(M=0)}{\pi_R \pi_A(a,1) \pi_M(a,1)}\right\} \\
&= E\left\{\frac{(1-\pi_R) I(A=a, R=1, M=0)}{\Pr(M=0 \mid A=a, R=1, X) \Pr(A=a \mid R=1, X) \Pr(R=1 \mid X)}\right\} \\
&= E\left\{\frac{(1-\pi_R) I(A=a, R=1, M=0)}{\Pr(M=0, A=a, R=1 \mid X)}\right\} \\
&= E\left[E\left\{\frac{(1-\pi_R) I(A=a, R=1, M=0)}{\Pr(M=0, A=a, R=1 \mid X)} \middle| X\right\}\right] \\
&= E\left\{\frac{(1-\pi_R) E\left\{I(A=a, R=1, M=0) \mid X\right\}}{\Pr(M=0, A=a, R=1 \mid X)}\right\} \\
&= E\left\{\frac{(1-\pi_R) \Pr(M=0 \mid A=a, R=1, X) \Pr(A=a \mid R=1, X) \Pr(R=1 \mid X)}{\pi_R \pi_A(a,1) \pi_M(a,1)}\right\} \\
&= E(1-\pi_R) \\
&= E\{\Pr(R=2 \mid X)\} \\
&= E\left[E\left\{I(R=2) \mid X\right\}\right] \\
&= \Pr(R=2)
\end{aligned}
$$

同样，H ajek估计量 $\hat{} E_2(Y^a \mid R=2; \hat{}\eta_e)$ 的动机来自因果均值 (1).

(3) 和 (4) 的一致性与渐近正态性（第 2.3 节）

令 $\theta_{ms} = \{\eta_1, \alpha_2^2, \alpha_2^3, \alpha_1^1, \alpha_1^2, ATE^{3-1}\}$ 和 $\theta_{ss} = \{\eta_2, \alpha_2^3, \alpha_1^1, ATE^{3-1}\}$ 分别表示多跨度和单跨度估计量的参数向量，其中 $\alpha_r^a = E_r[Y^a \mid R=2; \eta_e]$ 对于 $e \in \{1,2\}$ 以及对于 $(a,\ r) \in \{(1,\ 1),\ (2,\ 1),\ (2,\ 2),\ (3,\ 2)\}$。注意，多跨度参数向量中包含 $\alpha_2^2 = \alpha_1^2$。回想一下，试验1中有 n_1 个 $O_i = \{R_i = 1, A_i, M_i, I(M_i = 0)Y_i,\ X_i\}$的独立同分布副本，试验2中有 n_2 个$O_i = \{R_i = 2, A_i, M_i, I(M_i = 0)Y_i,\ X_i\}$的独立同分布副本。将两项试验中 $n_1 + n_2$ 名参与者的数据合并。假设试验1中参与者 i 的观测值与试验2中参与者 j 的观测值相互独立，但不一定同分布。假设 $\lim_{n\to\infty} n_r/n = \pi_r$，其中未知抽样比例为 $\pi_r > 0$，且 $r \in \{1,2\}$ 和$\pi_1 + \pi_2 = 1$。

多跨度估计量 考虑多跨度估计量的估计方程组：

$$
\sum_{i=1}^{n} \Psi_i(O_i; \theta_{ms}) = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n \Psi_1(O_i; \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) \\ \sum_{i=1}^n \Psi_2(O_i; \gamma_1) \\ \sum_{i=1}^n \Psi_3(O_i; \eta_1, \alpha_2^2) \\ \sum_{i=1}^n \Psi_4(O_i; \eta_1, \alpha_2^3) \\ \sum_{i=1}^n \Psi_5(O_i; \eta_1, \alpha_1^1) \\ \sum_{i=1}^n \Psi_6(O_i; \eta_1, \alpha_1^2) \\ \alpha_2^3 - \alpha_2^2 + \alpha_1^2 - \alpha_1^1 - ATE^{3-1} \end{bmatrix} = 0. \tag{A.19}
$$

向量 Ψ_1 由四组估计方程 Ψ_{1q} 组成，它们对应于正文中定义的组别 $q \in \{1,2,3,4\}$ 的缺失模型得分方程。假设四个缺失模型的形式为 $\text{logit}\{P(M_i = 0 \mid X_i;\ \lambda_q)\} = g_m(X_i)\lambda_q$，适用于组别 q，其中 $q \in \{1,2,3,4\}$。假设 $g_m(X_i)$包含协变量的函数，使得 $g_m(X_i)$的每个元素取值范围有限。向量 Ψ_2 包含以下得分方程：

该抽样模型使用来自全部四个组别的数据进行拟合。假设抽样模型的形式为 $\text{logit}\{P(R_i = 2 \mid X_i; \gamma_1)\} = g_s(X_i)\gamma_1$。在缺失模型和抽样模型设定正确的假设下，根据极大似然理论， Ψ_1 和 $\hat{}\Psi_2$ 均为无偏估计，其解分别为 λ_q（对应于 $q \in \{1,2,3,4\}$）和 $\hat{}\gamma_1$。

考虑 Ψ_3 和 Ψ_4，它们是针对 $a \in \{2,3\}$的 α_2^a 的估计方程。这些估计方程可分别表示为 $\Psi_j = \sum_{i=1}^{n} \hat{}W_{Mi}W_{Ai}(Y_i - \alpha_2^a)$ $I(A_i = a)I(R_i = 2)I(M_i = 0) = 0$，对应于 $j \in \{3,4\}$ 和 $a \in \{2,3\}$。为简化符号表示，省略下标 i，并将权重视为已知量，

$$
\begin{aligned}
&E\{W_M W_A(Y - \alpha_2^a)I(A = a)I(R = 2)I(M = 0)\} \\
&= E\{W_M W_A(Y^a - \alpha_2^a)I(A = a)I(R = 2)I(M = 0)\} && \text{(A.20)} \\
&= E[W_M W_A I(A = a)I(R = 2)E\{(Y^a - \alpha_2^a)I(M = 0) \mid A, R, X\}] && \text{(A.21)} \\
&= E[W_M W_A I(A = a)I(R = 2)E\{(Y^a - \alpha_2^a) \mid A, \ R, \ X\}E\{I(M = 0) \mid A, \ R, \ X\}] && \text{(A.22)} \\
&= E\{W_A I(A = a)I(R = 2)(Y^a - \alpha_2^a)\} && \text{(A.23)} \\
&= E\left[W_A I(R = 2)E\{I(A = a)(Y^a - \alpha_2^a) \mid X, R = 2\}\right] Pr(R = 2) && \text{(A.24)} \\
&= E\left[W_A I(R = 2)E\{I(A = a) \mid X, R = 2\}E(Y^a - \alpha_2^a \mid X, R = 2)\right] Pr(R = 2) && \text{(A.25)} \\
&= E[I(R = 2)E\{(Y^a \mid R = 2) \ - \alpha_2^a\}]Pr(R = 2) && \text{(A.26)} \\
&= 0 && \text{(A.27)}
\end{aligned}
$$

其中，(A.20) 根据因果一致性成立，(A.21) 根据迭代期望成立，(A.22) 因为 $Y^a \perp M \mid \{A, R, X\}$ for$a \in \{2,3\}$，(A.23) 根据 W_M 的定义成立，(A.24) 根据迭代期望和全期望定律成立，(A.25) 因为 $Y^a \perp A \mid \{X, R = 2\}$，(A.26) 根据 W_A 的定义成立，而 (A.27) 根据 α_2^a 的定义成立。因此， Ψ_3 和 Ψ_4 是无偏估计方程，其解分别为 $\hat{}\alpha_2^2$ 和 $\hat{}\alpha_2^3$。

考虑 Ψ_5 和 Ψ_6, 基于非焦点人群数据估计 $a \in \{1,2\}$ 的 α_1^a 的估计方程 1
人群。这些估计 方程可以写为:

$$\Psi_j = \sum_{i=1}^{n} \hat{W}_{Mi}\hat{W}_{Si}W_{Ai}(Y_i - \alpha_1^a)I(A_i = a)I(R_i = 1)I(M_i = 0) = 0$$

分别对应 $j \in \{5,6\}$ 和 $a \in \{1,2\}$。为简化记号，省略下标 i，并将权重视为已知，

$$
\begin{aligned}
&E\{W_M W_S W_A(Y - \alpha_1^a)I(A = a)I(R = 1)I(M = 0)\} \\
&= E\{W_M W_S W_A(Y^a - \alpha_1^a)I(A = a)I(R = 1)I(M = 0)\} && \text{(A.28)} \\
&= E[W_M W_S W_A I(A = a)I(R = 1)E\{(Y^a - \alpha_1^a)I(M = 0) \mid A, R, X\}] && \text{(A.29)} \\
&= E[W_M W_S W_A I(A = a)I(R = 1)E\{(Y^a - \alpha_1^a) \mid A, R, X\}E\{I(M = 0) \mid A, R, X\}] && \text{(A.30)} \\
&= E\{W_S W_A I(A = a)I(R = 1)(Y^a - \alpha_1^a)\} && \text{(A.31)} \\
&= E[W_S W_A I(R = 1)E\{I(A = a)(Y^a - \alpha_1^a) \mid R, X\}] && \text{(A.32)} \\
&= E[W_S W_A I(R = 1)E\{I(A = a) \mid R, \ X\}E\{(Y^a - \alpha_1^a) \mid R, \ X\}] && \text{(A.33)} \\
&= E\{W_S I(R = 1)(Y^a - \alpha_1^a)\} && \text{(A.34)} \\
&= E[E\{W_S I(R = 1)(Y^a - \alpha_1^a) \mid X, R = 1\}Pr(R = 1 \mid X)] && \text{(A.35)} \\
&= E[W_S E\{I(R = 1) \mid X, R = 1\}E\{(Y^a - \alpha_1^a) \mid X, R = 2\}Pr(R = 1 \mid X)] && \text{(A.36)} \\
&= E[Pr(R = 2 \mid X)E\{I(R = 1) \mid X, R = 1\}E\{(Y^a - \alpha_1^a) \mid X, R = 2\}] && \text{(A.37)} \\
&= E[Pr(R = 2 \mid X)E\{I(R = 1) \mid R = 1\}E\{(Y^a - \alpha_1^a) \mid R = 2\}] && \text{(A.38)} \\
&= 0 && \text{(A.39)}
\end{aligned}
$$

其中，(A.28) 根据因果一致性成立，(A.29) 根据迭代期望成立，(A.30) 成立是因为 $Y^a \perp M \mid\{A, R, X\}$，(A.31) 根据 W_M 的定义成立，(A.32) 根据迭代期望成立，(A.33) 成立是因为 $Y^a \perp A \mid X, R$ 对于 $a \in \{1,2\}$，(A.34) 根据 W_A 的定义和迭代期望成立，(A.35) 根据迭代期望和全期望定律成立，(A.36) 成立是因为 $Y^a \perp R \mid X$，(A.37) 是通过将 $Pr(R = 1 \mid X)$ 与 W_S 的分母约去得到的，(A.38) 根据迭代期望成立，(A.39) 根据 α_1^a 的定义成立。因此， Ψ_5 和 Ψ_6 是无偏估计方程，其解为 $\hat{}\alpha_1^1$ 和 $\hat{}\alpha_1^2$。

根据 ATE^{3-1} 的定义，估计方程 $\Psi_7 = \alpha_2^3 - \alpha_2^2 + \alpha_1^2 - \alpha_1^1 - ATE^{3-1}$ 等于零，因此是无偏的。由于 (3) 是无偏估计方程向量的解，因此在适当的正则条件下，(3) 是 θ_{ms} 的一致渐近正态估计量，其渐近方差可通过经验三明治方差估计量进行一致估计（Yuan 和 Jennrich，1998）。




图 A1：第 4 节受限模型中，抽样权重的对数逆优势比和缺失概率逆权重（IPMW）的分布，模型包含基线 CD4 细胞计数 < 200

单跨度估计量 考虑单跨度估计量的估计方程组：

$$\sum_{i=1}^{n} \Psi_i(O_i;\theta_{ss}) = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} \Psi_1(O_i;\lambda_1,\lambda_4) \\ \sum_{i=1}^{n} \Psi_2(O_i;\gamma_2) \\ \sum_{i=1}^{n} \Psi_4(O_i;\eta_2,\alpha_2^3) \\ \sum_{i=1}^{n} \Psi_5(O_i;\eta_2,\alpha_1^1) \\ \alpha_2^3 - \alpha_1^1 - ATE^{3-1} \end{bmatrix} = 0$$

对于单跨度估计量， Ψ_1 包含两个分量，分别等价于多跨度估计量中的 ψ_{14} 和 ψ_{11}。向量 Ψ_2 包含抽样模型的得分方程，该模型仅使用组别 $q \in \{1,4\}$的数据进行拟合。假设抽样模型的形式为 $\text{logit}\{P(R_i = 2 \mid X_i;\ \gamma_2)\} = g_S(X_i)\gamma_2$。方程 Ψ_4 和 Ψ_5 与多跨度估计量中的方程相同，但将 η_1 替换为 η_2。这些估计方程的无偏性可由多跨度估计量的证明推出，同时注意到 $\alpha_2^3 - \alpha_1^1 - ATE^{3-1}$ 等于零，因此根据 ATE^{3-1}的定义，其本身是无偏的。请注意，这组估计方程不包含共同治疗组的估计量，因此，第2.2节中针对单跨度方法列出的识别假设子集足以证明其无偏性。由于（4）是无偏估计方程向量的解，因此在适当的正则条件下，它是θ_{ss} 的一致且渐近正态估计量，而经验三明治方差估计量是（4）的渐近方差的一致估计量。

$\widehat{}$诊断统计量的一致性与渐近正态性 D_m （第 2.3 节）

回顾第 6 节中的诊断估计量 D_m： $\widehat{D}_m = \hat{E}_2(Y^2 \mid R = 2;\ \eta_1) - \hat{E}_1(Y^2 \mid R = 2;\ \eta_1) = \hat{\alpha}_2^2 - \hat{\alpha}_1^2$。根据上述一致性证明，$\hat{\alpha}_2^2 \xrightarrow{p} \alpha_2^2$ 和$\hat{\alpha}_1^2 \xrightarrow{p} \alpha_1^2$。由于 $\alpha_2^2 = \alpha_1^2 = E(Y^2 \mid R = 2)$，$\hat{D}_m \xrightarrow{p} 0$。此外，$\widehat{D}_m$ 可表示为估计方程 $\Psi_8 = \alpha_2^2 - \alpha_1^2 - D_m$的解。当识别假设成立时，该估计方程等于零，因此是无偏的。方程 Ψ_8 可以与（A.19）堆叠起来。$\widehat{}$由于 D_m 是无偏估计方程向量的解，因此它是一致且渐近正态的，其方差可以通过经验三明治方差估计量进行一致估计。

补充表格和图

表 A1：连续结局的模拟汇总结果，$n_1 = 400, n_2 = 1000$，2000 次模拟。计算 ATE 的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和 95%置信区间覆盖率。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断	诊断 95%置信区间包含零（%）
1	朴素 MS	0.0	5.02	5.04	1.00	5.0	94	0.1	95
	朴素 SS	0.1	3.55	3.49	1.02	3.5	95		
	桥接 多跨度	0.0	5.02	5.04	1.00	5.0	95	0.0	95
	桥接单跨度	0.0	2.20	2.14	1.02	2.1	96		
2	朴素 MS	18.0	6.33	6.37	0.99	19.1	18	20.5	0
	朴素 SS	38.4	5.10	5.14	0.99	38.8	0		
	桥接 多跨度	0.1	6.56	6.59	1.00	6.6	95	0.2	95
	桥接单跨度	0.2	3.63	3.65	1.00	3.7	94		
3	朴素 MS	37.3	6.27	6.31	0.99	37.8	0	1.1	94
	朴素 SS	38.4	5.10	5.14	0.99	38.8	0		
	桥接 MS 19.2		6.47	6.51	0.99	20.3	16	-18.9	0
	桥接 SS	0.3	3.63	3.65	1.00	3.7	95		
4	朴素 MS	47.9	6.32	6.36	0.99	48.4	0	20.5	0
	朴素 SS	68.4	5.09	5.13	0.99	68.6	0		
	桥接 MS 30.1		6.56	6.59	1.00	30.8	0	0.2	95
	桥接 单跨度	30.2	3.63	3.65	1.00	30.5	0		
5	朴素 MS	58.0	6.32	6.36	0.99	58.3	0	10.5	20
	朴素 SS	68.4	5.09	5.13	0.99	68.6	0		
	桥接 MS 40.1		6.56	6.59	1.00	40.7	0	-9.8	25
	桥接单跨度	30.3	3.63	3.65	1.00	30.5	0		

ASE=平均估计标准误；ESE=经验标准误；SER=标准误比（ASE/ESE）；RMSE = 均方根误差；CI = 置信区间；SS=单跨度；MS=多跨度；当覆盖率为95%时，95%置信区间覆盖率的蒙特卡洛标准误为0.5%。

表 A2：二元结局的模拟汇总结果，$n_1 = 400$，$n_2 = 1000$，2000 次模拟。计算 ATE 的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和 95%置信区间覆盖率（以百分比表示）。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断	诊断 95%置信区间包含零（%）
1	朴素 MS	0.0	5.83	5.89	0.99	5.9	95	0.1	95
	朴素 SS	0.1	4.01	3.99	1.00	4.0	95		
	桥接 多跨度	0.0	5.83	5.90	0.99	5.9	95	0.0	94
	桥接单跨度	0.1	3.30	3.34	0.99	3.3	94		
2	朴素 MS	-4.6	4.63	4.54	1.02	6.5	83	14.0	3
	朴素 SS	9.4	3.02	2.99	1.01	9.8	14		
	桥接 多跨度	-0.2	7.11	7.10	1.00	7.1	95	0.3	94
	桥接单跨度	0.1	4.31	4.29	1.00	4.3	94		
3	朴素 MS	11.6	4.93	4.80	1.03	12.6	35	-2.2	92
	朴素 SS	9.4	3.02	2.99	1.01	9.8	14		
	桥接 MS	19.7	7.10	7.06	1.01	20.9	22	-19.6	2
	桥接 SS	0.1	4.31	4.29	1.00	4.3	94		
4	朴素 MS	6.8	4.30	4.23	1.02	8.0	65	14.0	3
	朴素 SS	20.8	2.49	2.45	1.01	20.9	0		
	桥接 MS	16.3	6.40	6.42	1.00	17.6	29	0.3	94
	桥接单跨度	16.7	3.48	3.52	0.99	17.0	1		
5	朴素 MS	13.1	4.56	4.47	1.02	13.8	18	7.6	47
	朴素 SS	20.8	2.49	2.45	1.01	20.9	0		
	桥接 MS	25.3	6.45	6.44	1.00	26.1	3	-8.7	57
	桥接 单跨度	16.7	3.48	3.52	0.99	17.0	1		

ASE=平均估计标准误；ESE=经验标准误；SER=标准误比（ASE/ESE）；RMSE = 均方根误差；CI = 置信区间；SS=单跨度；MS=多跨度；当覆盖率为95%时，95%置信区间覆盖率的蒙特卡洛标准误为0.5%。

表A3：连续结局的模拟汇总结果，$n_1 = 1000$、$n_2 = 2000$，2000 次模拟。计算平均处理效应的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和95%置信区间覆盖率。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断	诊断 95%置信区间包含零 (%)
1	朴素 MS	0.0	3.29	3.37	0.98	3.4	94	0.0	94
	朴素 SS	-0.1	2.33	2.37	0.98	2.4	94		
	桥接 多跨度	0.0	3.29	3.35	0.98	3.4	94	0.0	95
	桥接单跨度	0.0	1.42	1.45	0.98	1.4	94		
2	朴素 MS	17.8	4.11	4.19	0.98	18.3	1	20.3	0
	朴素 SS	38.1	3.30	3.34	0.99	38.3	0		
	桥接 多跨度	-0.1	4.26	4.39	0.97	4.4	94	0.1	94
	桥接单跨度	-0.1	2.36	2.38	0.99	2.4	94		
3	朴素 MS	37.2	4.06	4.14	0.98	37.4	0	1.0	92
	朴素 SS	38.1	3.30	3.34	0.99	38.3	0		
	桥接 多跨度	19.0	4.19	4.32	0.97	19.5	1	-19.0	0
	桥接 SS	-0.1	2.36	2.38	0.99	2.4	94		
4	朴素 MS	47.8	4.10	4.19	0.98	48.0	0	20.3	0
	朴素 SS	68.1	3.29	3.34	0.99	68.2	0		
	桥接 MS	29.9	4.26	4.39	0.97	30.2	0	0.1	94
	桥接 SS	29.9	2.36	2.38	0.99	30.0	0		
5	朴素 MS	57.8	4.10	4.19	0.98	57.9	0	10.3	2
	朴素 SS	68.1	3.29	3.34	0.99	68.2	0		
	桥接 MS	39.9	4.26	4.39	0.97	40.1	0	-9.9	2
	桥接 SS	29.9	2.36	2.38	0.99	30.0	0		

ASE=平均估计标准误；ESE=经验标准误；SER=标准误比（ASE/ESE）；RMSE = 均方根误差；CI = 置信区间；SS=单跨度；MS=多跨度；当覆盖率为95%时，95%置信区间覆盖率的蒙特卡洛标准误为0.5%。

表 A4：二元结局的模拟汇总结果（以百分比格式表示），$n_1 = 1000$、$n_2 = 2000$，2000 次模拟。计算了平均处理效应（以百分比格式表示）的偏倚、渐近标准误、经验标准误、标准误比、均方根误差和 95%置信区间覆盖率。

情景	估计量	偏倚	渐近标准误	经验标准误	标准误比	均方根误差	95%置信区间覆盖率（%）	Mean 诊断	诊断 95%置信区间包含零（%）
1	朴素 MS	0.0	3.79	3.82	0.99	3.8	95	-0.1	95
	朴素 SS	-0.1	2.59	2.60	0.99	2.6	95		
	桥接 MS	0.0	3.79	3.81	0.99	3.8	95	-0.1	95
	桥接 SS	0.0	2.14	2.14	1.00	2.1	95		
2	朴素 MS	-4.5	3.10	3.12	1.00	5.5	69	13.8	0
	朴素 SS	9.3	2.06	2.05	1.01	9.5	1		
	桥接 MS	-0.2	4.62	4.68	0.99	4.7	94	0.1	94
	桥接 SS	-0.1	2.78	2.74	1.02	2.7	96		
3	朴素 MS	11.7	3.27	3.30	0.99	12.1	6	-2.4	84
	朴素 SS	9.3	2.06	2.05	1.01	9.5	1		
	桥接 MS	19.6	4.61	4.67	0.99	20.1	1	-19.7	0
	桥接 SS	-0.1	2.78	2.74	1.02	2.7	96		
4	朴素 MS	6.9	2.89	2.92	0.99	7.5	32	13.8	0
	朴素 SS	20.7	1.73	1.72	1.00	20.8	0		
	桥接 MS	16.4	4.19	4.23	0.99	17.0	3	0.1	94
	桥接 SS	16.5	2.31	2.32	1.00	16.7	0		
5	朴素 MS	13.3	3.05	3.09	0.99	13.6	1	7.4	18
	朴素 SS	20.7	1.73	1.72	1.00	20.8	0		
	桥接 MS	25.4	4.22	4.30	0.98	25.8	0	-8.9	20
	桥接 SS	16.5	2.31	2.32	1.00	16.7	0		

渐近标准误=平均估计标准误；经验标准误=经验标准误；标准误比=标准误比（渐近标准误/经验标准误）；均方根误差 = 均方根误差；置信区间 = 置信区间；单跨度=单跨度；多跨度=多跨度；当95%置信区间覆盖率为95%时，其蒙特卡洛标准误为0.5%。